ЛП-№(010074)-(РГ-RU) от 07.05.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2025 № 11622
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Атероклефит®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Атероклефит®

Международное непатентованное или группировочное наименование: клевера травы экстракт

Лекарственная форма: экстракт для приема внутрь жидкий

Состав

Для получения 1000 мл препарата используют:

Активный компонент:

Клевера трава – 500 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 40 % – достаточное количество для получения 1000 мл препарата.

Описание

Жидкость от светло- до темно-коричневого цвета со специфическим запахом. При хранении допускается появление осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Гиполипидемическое средство растительного происхождения.

Код АТХ: C10AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат Атероклефит® представляет собой жидкий экстракт из травы клевера красного, собранного в фазу цветения. Экстракт получен путем двойной экстракции травы клевера красного 40 % этанолом. Согласно результатам проведенных доклинических исследований, жидкий экстракт травы клевера красного обладает умеренным гиполипидемическим действием: способствует снижению концентрации общего холестерина, концентрации липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и повышению

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2025 № 11622
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

концентрации липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).

Механизм действия жидкого экстракта травы клевера красного связан с перераспределением холестерина из ЛПНП в ЛПВП, в составе которых холестерин быстрее метаболизируется и выводится из организма. Жидкий экстракт травы клевера красного также способствует снижению интенсивности перекисного окисления липидов, в результате чего уменьшается перекисная модификация липопротеидов и нормализуется проницаемость сосудистой стенки.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Гиперлипидемия IIа типа по Фредериксону, слабовыраженная.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, заболевания печени, выраженные нарушения функции почек, алкоголизм (из-за наличия в составе этанола), беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью

Применять пациентам с нарушениями функции почек легкой и средней степени тяжести, эпилепсией.

Лицам, имеющим хронические заболевания, перед применением препарата обязательно проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания. При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы

Внутрь: по 1 чайной ложке препарата, предварительно разведенного в 1/3 стакана воды, 3 раза в день за 30 минут до приема пищи. Курс лечения 3–6 месяцев.

Проведение повторного курса лечения возможно по рекомендации врача.

Перед назначением препарата, пациент должен быть переведен на гипохолестеринемическую диету, которую должен соблюдать в течение всего периода терапии.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2025 № 11622
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (кожный зуд, сыпь), а также тошнота, головная боль, ощущение горечи во рту.

При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в инструкции, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны усиление дозозависимых побочных эффектов, признаки алкогольной интоксикации (головокружение, тошнота, рвота). Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

В настоящее время нет данных о взаимодействии препарата Атероклефит® при совместном применении его с другими лекарственными препаратами, в частности, с гиполипидемическими препаратами.

Особые указания

Перед тем, как начать применение препарата, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

В период терапии препаратом Атероклефит® необходим контроль активности «печеночных» трансаминаз, креатинфосфокиназы, контроль функции почек.

С этой целью, в период приема препарата Атероклефит® рекомендуется посещать врача не реже 1 раза в месяц с целью коррекции терапии в случае необходимости. Кратность и сроки посещения определяются лечащим врачом.

Содержание этанола в препарате составляет не менее 35 %. Разовая доза препарата (1 чайная ложка) содержит 1,58 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза (3 чайные ложки) содержит 4,74 г абсолютного этилового спирта.

Не следует превышать указанную суточную дозу.

Женщины детородного возраста при применении препарата должны использовать надежные методы контрацепции.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения препаратом Атероклефит® необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2025 № 11622
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Форма выпуска

Экстракт для приема внутрь жидкий. По 50 или 100 мл во флаконы из коричневого или оранжевого стекла для лекарственных средств, укупоренные крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокой плотности с уплотняющим элементом и контролем первого вскрытия.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии от потребителей

ЗАО «Эвалар», Россия, 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, тел. (3854) 39-00-50, 8-800-200-52-52, www.evalar.ru