

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АНАФРАНИЛ®

Таблетки покрытые оболочкой, 25 мг

Новартис Фарма С.п.А., Италия

Изменение №2

Дата внесения изменения «_____» **211019** 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
<i>Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого лекарства.</i> <i>Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.</i> <i>Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.</i> <i>Это лекарство назначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.</i>	Предупредительная надпись удалена.
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Анафранил®	ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Анафранил®
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ (МНН): кломипрамин	МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (МНН): кломипрамин
СОСТАВ: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит: <u>действующее вещество</u> - кломипрамина гидрохлорид 25,0 мг, а также <u>вспомогательные вещества</u>: лактозы моногидрат – 15,0 мг, крахмал кукурузный –	СОСТАВ: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит: <u>действующее вещество</u> - кломипрамина гидрохлорид 25,000 мг, <u>вспомогательные вещества</u>: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный,

Старая редакция	Новая редакция
3,5 мг, кремния диоксид коллоидный безводный – 3,0 мг, стеариновая кислота – 1,5 мг, тальк - 1,5 мг, магния стеарат – 0,25 мг, глицерол (85%) - 0,25 мг; <u>сахарная оболочка</u>: тальк – 6,22 мг, гипромеллоза – 0,43 мг, коповидон (сополимер винилпирролидон/винилацетат) - 0,43 мг, титана диоксид – 0,26 мг, сахароза кристаллическая – 16,5 мг, поливинилпирролидон К 30 (повидон К30) – 0,36 мг, краситель желтый дисперсный 15093 Анстед (краситель железа оксид желтый [ЕЕС172] 5% + титана диоксид 95% [ЕЕС171]) – 0,32 мг, полиэтиленгликоль 8000 (макрогол 8000) – 0,24 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 0,24 мг.	кремния диоксид коллоидный безводный, стеариновая кислота, тальк, магния стеарат, глицерол 85%; <i>сахарная оболочка</i>: тальк, гипромеллоза, коповидон (сополимер винилпирролидон/винилацетат), титана диоксид, сахароза кристаллическая, поливинилпирролидон К 30 (повидон К30), краситель желтый дисперсный Анстед (краситель железа оксид желтый [СІ 77492; Е172] + титана диоксид [СІ 77891; Е171]), полиэтиленгликоль 8000 (макрогол 8000), целлюлоза микрокристаллическая.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Хранить при температуре не выше 25 °С. Предохранять от воздействия влаги. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.



Стародубова М.В.

Менеджер отдела регулирования
обращения лекарственных средств
ООО «Новартис Фарма»