ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

КАНЕСТЕН®

Регистрационный номер:

Торговое название: Канестен®

Международное непатентованное название: клотримазол.

Лекарственная форма: спрей для наружного применения.

Описание: от бесцветного до слегка желтоватого цвета прозрачный раствор.

Состав

В 100 мл спрея содержится:

Действующее вещество: клотримазол 1,00 г;

Вспомогательные вещества: изопропил миристат 2,50 г, макрогол 400 (Полиэтиленгликоль 400) 5,00 г, изопропанол (2-пропанол) 72,10 г.

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковое средство.

Код АТХ: D01AC01

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Клотримазол, активное вещество спрея Канестен®, является производным имидазола и обладает широким спектром антимикотического действия. Механизм действия клотримазола связан с ингибированием синтеза эргостерина, что приводит к нарушению структуры и функций цитоплазматической мембраны грибов. Обладает фунгистатической или фунгицидной активностью в зависимости от концентрации в очаге инфекции.

Канестен® активен в отношении дерматофитов, дрожжеподобных, плесневых грибов, а также возбудителя разноцветного лишая (Pityriasis vers.) и возбудителя эритразмы. Наряду с антимикотическим, Канестен® обладает антимикробным действием в отношении Trichomonas vaginalis, грамположительных (стрептококки, стафилококки) и грамотрицательных микроорганизмов (Bacteroides, Gardenerella vaginalis).

In vitro в концентрациях 0,5-10 мкг/мл клотримазол подавляет размножение бактерий семейства Corynebacteria и грамположительных кокков (за исключением энтерококков) и оказывает трихомонацидное воздействие в концентрации 100 мкг/мл.

Первично резистентные штаммы чувствительных к клотримазолу грибов встречаются очень редко; развитие вторичной резистентности наблюдается лишь в отдельных случаях и только в определённых терапевтических условиях.

Фармакокинетика

Клотримазол практически не всасывается через интактную и воспаленную кожу. Максимальная концентрация клотримазола в плазме крови ниже 0,001 мкг/мл, что подтверждает тот факт, что клотримазол при местном применении на кожу не приводит к значимым системным побочным эффектам.

Показания

Грибковые заболевания кожи вызванные дерматофитами, дрожжеподобными грибами, плесневыми грибами, а также возбудителями, чувствительными к клотримазолу:

- микозы стоп, кистей, туловища, кожных складок;
- отрубевидный лишай, эритразма.

Противопоказания

Гиперчувствительность к клотримазолу или другим компонентам препарата.

Способ применения и режим дозирования

Применять наружно. Спрей Канестен® распылять тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в день.

Длительность терапии индивидуальна и зависит от тяжести и локализации заболевания. Для достижения полного выздоровления не следует прекращать лечение спреем сразу же после исчезновения острых симптомов воспаления или субъективных жалоб. Длительность терапии должна составлять в среднем около 4-х недель, по его завершении (при исчезновении клинических проявлений) целесообразно продолжить лечение еще в течение 14 дней.

Дерматомикозы излечиваются, в основном, в течение 3-4 недель, разноцветный лишай 1-3 недель. При грибковых заболеваниях кожи ног рекомендуется продолжать терапию около 2-3 недель после купирования симптомов заболевания. Перед смазыванием стопы моют теплой водой с мылом, тщательно вытирают, особенно между пальцами.

С осторожностью

Беременность и период лактации.

Передозировка

Применение спрея в повышенных дозах не вызывает каких-либо опасных для жизни реакций.

Побочное действие

Организм в целом: аллергические реакции; боль.

Кожные покровы: местные реакции (жжение, отек, раздражение и шелушение кожи, парестезии, эритематозные высыпания, появление волдырей).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Амфотерицин В, нистатин, натамицин снижают эффективность клотримазола при одновременном их применении.

Применение при беременности и лактации

Хотя и не установлено, что в период беременности и лактации Канестен® спрей оказывает негативное влияние на организм матери и плода, тем не менее, в первые 3 месяца беременности и в период лактации препарат может применяться только после консультации с врачом.

Особые указания

Необходимо избегать попадания на слизистую оболочку глаз. При появлении признаков гиперчувствительности или раздражения лечение прекращают. При отсутствии эффекта в течение 3 дней, следует подтвердить диагноз.

Влияние на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами

Не наблюдается.

Форма выпуска

Спрей для наружного применения 1%

По 30 мл в непрозрачный полиэтиленовый флакон белого цвета, снабженный помповым дозатором и защитным колпачком из пластика; по 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Срок годности. 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Байер, Россия, произведено Тропонверке ГмбХ, Германия D-51063 Кельн, Германия

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

107113 Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2

Тел.:(495)231-12-00, факс (495) 231-12-02

Менеджер отл. регистрации
и сертификации

Bayer Consumer Care AG BAYER

Олейник Е.Ф.