

С. 001.12.00 1000 ЮМ. 09-11-11

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  
КЛОТРИМАЗОЛ**

**Регистрационный номер:** П №014443/03-2002 от 10.10.2002

**Торговое название препарата:** клотримазол

**Международное название:** Клотримазол (Clotrimazole)

**Лекарственная форма:** 1% крем

**Состав:**

*Активное вещество* - клотримазол 1%

*Вспомогательные вещества* - жидкий парафин, кетостерилловый спирт, белый мягкий парафин, кетомакрогол 1000, вода очищенная, хлорокрезол, динатрия эдетат, лимонная кислота, двухосновный натрия фосфат (безводный), пропиленгликоль, натрия метабисульфит.

**Фармакотерапевтическая группа**

Противогрибковое средство.

**Описание**

Гомогенный крем мягкой консистенции, эмульсионного типа, от белого до почти белого цвета.

**Фармакологические свойства**

Клотримазол является противогрибковым средством широкого спектра действия для местного применения. Антимикотический эффект активного действующего вещества клотримазола (производное имидазола) связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что изменяет проницаемость мембраны и вызывает последующий лизис клетки. Клотримазол эффективен в отношении дерматофитов, дрожжеподобных и плесневых грибов, а также возбудителя разноцветного лишая (Pityriasis versicolor) и возбудителя эритразмы. Клотримазол оказывает антимикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки, стрептококки) и грамотрицательных бактерий (Bacteroides, Gardnerella vaginalis), а также в отношении Trichomonas vaginalis, Corynebacterium minutissimum.

**Показания к применению**

- грибковые поражения кожи и слизистых оболочек, вызванные дерматофитами, дрожжеподобными и плесневыми грибами, а также возбудителями, чувствительными к клотримазолу;
- отрубевидный лишай, эритразма;
- микозы, осложненные вторичной пиодермией.

**Противопоказания**

Клотримазол нельзя применять при наличии повышенной чувствительности к клотримазолу или вспомогательным веществам.


**Побочные действия**

В редких случаях наблюдаются местные аллергические реакции (покраснение, жжение, зуд, покалывание в местах нанесения препарата).

**Применение во время беременности и в период кормления грудью**

При клинических и экспериментальных исследованиях не было установлено, что применение клотримазола в период беременности или в период кормления грудью оказывает отрицательное влияние на здоровье женщины или плода (ребенка). Однако, вопрос о целесообразности назначения препарата должен решаться индивидуально после консультации врача.

Нанесение клотримазола непосредственно на молочную железу при грудном вскармливании противопоказано.



## Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При местном применении препарата отрицательные взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

При одновременном применении с нистатином активность клотримазола может снижаться.

## Способ применения и дозы

Крем рекомендуется наносить 2-3 раза в день тонким слоем на предварительно очищенные и сухие пораженные участки кожи.

Для успешного лечения важно регулярное применение крема.

Длительность терапии индивидуальна и зависит от тяжести и локализации заболевания. Для достижения полного выздоровления не следует прекращать лечение кремом сразу же после исчезновения острых симптомов воспаления или субъективных жалоб. Длительность терапии должна составлять, в среднем около, 4 недель.

Отрубевидный лишай излечивается, в основном, в течение 1-3 недель, а эритезма в течение 2-4 недель. При грибковых заболеваниях кожи ног рекомендуется продолжать терапию около 2 недель после купирования симптомов заболевания.

## Особые указания

Если через 4 недели от начала лечения не отмечается клинического улучшения, необходимо провести микробиологическое исследование для подтверждения диагноза и исключения другой причины заболевания.

Если развивается повышенная чувствительность или раздражение при применении препарата, лечение необходимо прекратить и подобрать другую терапию.

Не рекомендуется нанесение препарата на кожу в области глаз.

## Форма выпуска

1% крем в тубах по 15 г, 20 г, 30 г, 50 г.

## Условия хранения

При температуре от 2° до 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.

## Срок годности

3 года. Не использовать препарат по истечении указанного на упаковке срока годности!

## Отпуск из аптек

Без рецепта.

## Производитель:

Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд., Индия.

Шрея Хаус, 301/А, Переира Хил Роуд, Андери (Ист.) Мумбай.

Адрес представительства:

119049 Москва, ул. Мытная, д.1, стр. 1, офис 2А; тел./ф. (495) 970-15-80

Директор ИДКЭД



В.В.Чельцов

Представитель фирмы

*Волгина*

Ю.Д.Волгина

