МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
П N013420/01-150114
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Бисептол®
наименование лекарственного препарата

таблетки 120 мг, 480 мг
лекарственная форма, дозировка

Пабяницкий фармацевтический завод Польфа АО
ул. марш. Пилсудского 5, 95-200 Пабянице, Польша
наименование производителя, страна

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «____» 150114 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: Бисептол® 120 мг: одна таблетка содержит: 100 мг сульфаметоксазола и 20 мг триметоприма и вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 42,25 мг, тальк – 3,75 мг, магния стеарат – 1,25 мг, поливиниловый спирт – 0,75 мг, метилпарагидроксибензоат – 0,15 мг, пропилпарагидроксибензоат – 0,10 мг, пропиленгликоль – 1,75 мг. Бисептол® 480 мг: одна таблетка содержит: 400 мг сульфаметоксазола и 80 мг триметоприма и	**Состав:** Бисептол® 120 мг: одна таблетка содержит: *действующие вещества:* сульфаметоксазол – 100,0 мг, триметоприм – 20,0 мг; *вспомогательные вещества:* крахмал картофельный – 42,25 мг, тальк – 3,75 мг, магния стеарат – 1,25 мг, поливиниловый спирт – 0,75 мг, метилпарагидроксибензоат – 0,15 мг, пропилпарагидроксибензоат – 0,10 мг, пропиленгликоль – 1,75 мг. Бисептол® 480 мг: одна таблетка содержит: *действующие вещества:*

вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 169,0 мг, тальк – 15,00 мг, магния стеарат – 5,00 мг, поливиниловый спирт – 3,00 мг, метилпарагидроксибензоат – 0,60 мг, пропилпарагидроксибензоат – 0,40 мг, пропиленгликоль – 7,00 мг.	сульфаметоксазол – 400,0 мг, триметоприм – 80,0 мг; *вспомогательные вещества:* крахмал картофельный – 169,0 мг, тальк – 15,00 мг, магния стеарат – 5,00 мг, поливиниловый спирт – 3,00 мг, метилпарагидроксибензоат – 0,60 мг, пропилпарагидроксибензоат – 0,40 мг, пропиленгликоль – 7,00 мг.
С осторожностью Препарат следует с осторожность применять у пациентов с дефицитом фолиевой кислоты, бронхиальной астмой и заболеваниями щитовидной железы.	**С осторожностью** Препарат следует с осторожностью применять у пациентов с дефицитом фолиевой кислоты, бронхиальной астмой и заболеваниями щитовидной железы.
Производитель и место производства Пабяницкий фармацевтический завод Польфа АО ул. марш. Пилсудского 5, 95-200 Пабянице, Польша	**Производитель и место производства** **Пабяницкий фармацевтический завод Польфа АО** ул. марш. Пилсудского 5, 95-200 Пабянице, Польша
Претензии потребителей направлять по адресу Представительства в РФ: ООО «ПОЛЬФА» (Польша), г. Москва 121248, Москва, Кутузовский просп.	**Претензии потребителей направлять по адресу:** Представительство АО «Пабяницкий фармацевтический завод «Польфа» в г. Москве 125047, г. Москва, Лесной 4-й пер,

7/4, корп. 5, кв. 12 тел.: (499) 243-16-63, (499) 243-18-36 факс: (499) 243-77-27	дом № 4 тел.: (495) 225-86-26

Глава Представительства
АО «Пабяницкий фармацевтический
завод «Польфа» в г. Москве



Е.А. Воротникова