

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Корилип

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Корилип

Международное непатентованное или группировочное наименование: Кокарбоксилаза +
Рибофлавин + Тиоктовая кислота

Лекарственная форма: Суппозитории ректальные

Состав на 1 суппозиторий:

Действующие вещества: кокарбоксилазы гидрохлорид – 25 мг, рибофлавин – 2 мг,
тиоктовая кислота (липоевая кислота) – 12 мг.

Вспомогательное вещество: жир твердый – до массы 0,95 г.

Описание:

Суппозитории желтого цвета, торпедообразной формы с возможными вкраплениями
оранжево-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: витамины; другие комбинированные витаминные
препараты; витамины, другие комбинации.

Код АТХ: A11JC

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, действие которого определяется эффектами, входящих в его
состав витаминов и коферментов, а также их синергичным действием.

Кокарбоксилаза (кофермент) катализирует карбоксилирование и декарбоксилирование
 α -кетокислот, участвует в процессах углеводного обмена. Через участие в пентозном
цикле опосредованно регулирует синтез нуклеиновых кислот, белков, липидов.
Способствует коррекции метаболического ацидоза и клеточной гипоксии, а также других
нарушений обмена веществ (недостаточность функции печени, почек, сердечно-
сосудистой системы, хронические интоксикации).

Рибофлавин (витамин B₂) в качестве кофермента флавинпротеинов участвует в
регуливании окислительно-восстановительных реакций (в процессах углеводного,
белкового и жирового обмена). Играет важную роль в синтезе гемоглобина и в поддержании
нормальной зрительной функции глаза, состояния слизистых оболочек и кожи.

Тиоктовая кислота участвует в окислительном декарбоксилировании пировиноградной
кислоты и других α -кетокислот, в регулировании липидного и углеводного обмена, играет
важную роль в процессе образования энергии в организме. Тиоктовая кислота обладает

гепатопротекторным действием, улучшает дезинтоксикационную функцию печени, защищает от воздействия экзо- и эндотоксинов.

Корилип улучшает тканевой обмен при различных физиологических и патологических состояниях, нуждающихся в коррекции кофакторами и субстратами.

Показания к применению

Препарат показан к применению у детей от 1 года и взрослых с профилактической и лечебной целью в комплексной терапии при различных патологических состояниях, таких как:

- Хроническая тканевая гипоксия;
- Снижение иммунитета;
- Бактериальные и вирусные инфекции, в том числе острые кишечные инфекции;
- Хронические соматические заболевания;
- Хронические интоксикации;
- Нарушение питания (гипотрофия) у детей.

Детям перед поступлением в детское учреждение, перед проведением профилактических прививок.

Взрослым и детям при интенсивной физической и умственной нагрузке, при стрессовых ситуациях, состояниях после перенесенных тяжелых заболеваний.

Как общеукрепляющее профилактическое средство для взрослых и детей в период эпидемии инфекционных заболеваний.

Как метаболическое средство у женщин при подготовке к беременности и при развитии фетоплацентарной недостаточности во время беременности.

Противопоказания

Детский возраст до 1 года.

Гиперчувствительность к кокарбоксилазы гидрохлориду, рибофлавинову, тиоктовой кислоте (липоевой кислоте) или к любому из вспомогательных веществ.

Воспаление или кровотечение в прямой кишке (противопоказание, связанное с путем введения).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Возможно применение при беременности (см. «Показания к применению»).

Лактация

Следует воздержаться от применения в период грудного вскармливания (отсутствуют клинические данные).

Фертильность

Препарат показан к применению у женщин, готовящихся к беременности (см. «Показания к применению»).

Способ применения и дозы

Препарат применяют ректально (вводят в прямую кишку).

Суппозитории назначают детям от 1 года до 6 лет по 1 суппозиторию в сутки; детям от 6 до 14 лет по 1–2 суппозитория в сутки, детям старше 14 лет и взрослым по 2–3 суппозитория в сутки.

Длительность курса лечения при бактериальных и вирусных инфекциях – 6–9 дней. При других патологических состояниях у детей – 10 дней, общая продолжительность лечения – 3–4 курса с промежутком в 20 дней (3–4 месяца).

При интенсивной физической и умственной нагрузке, при стрессовых ситуациях, состояниях после перенесенных тяжелых заболеваний, перед поступлением в детское учреждение, перед проведением профилактических прививок, в период эпидемии инфекционных заболеваний длительность курса составляет 10 дней.

При беременности длительность курса лечения составляет 10 дней. Общая продолжительность лечения 4–5 курсов с промежутками в 20 дней. Женщинам, готовящимся к беременности, применять препарат за 3–6 месяцев до беременности, курсами по 10 дней через 20 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции – крапивница, зуд, бронхоспазм, диспептические явления.

При появлении побочных реакций прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Отрицательного взаимодействия не отмечалось. Препарат может применяться в комплексной терапии.

Особые указания

Критериями продолжительности лечения наряду с клиническим состоянием являются цитохимические показатели активности ферментов лейкоцитов периферической крови (сукцинатдегидрогеназа и глицерофосфатдегидрогеназа).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные (25 мг + 2 мг + 12 мг). По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной. Две контурные упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке картонной

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

По рецепту.

Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение

ООО «Альтфарм»

142073, Россия, Московская область, г. Домодедово, д. Судаково, тер. Лесное, стр. 10б.

Тел.: +7 (495) 234-46-40

Производитель и организация, принимающая претензии потребителя

ООО «Альтфарм»

142073, Россия, Московская область, г. Домодедово, д. Судаково, тер. Лесное, стр. 10б.

Тел.: +7 (495) 234-46-40