

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
РектАктив®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: РектАктив®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Конского каштана обыкновенного семян экстракт

Лекарственная форма: Суппозитории ректальные

Состав на один суппозиторий:

Действующее вещество: Конского каштана обыкновенного семян экстракт (Каштана конского экстракт сухой), содержащий 20 % суммы тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин – 50 мг или 100 мг.

Вспомогательное вещество: жир твердый («Витепсол Н15», или «Керносол 35», или «Loders Croklaan B.V.») – 950 мг или 900 мг.

Описание:

Суппозитории от белого с коричневым оттенком до коричневого цвета торпедообразной формы. На поверхности и на срезе суппозитория допускаются вкрапления темно-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Средства для лечения запоров; другие средства для лечения запоров.

Код АТХ: А06АХ

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Тритерпеновый сапонин эсцин, содержащийся в экстракте конского каштана, стимулирует интерорецепторы слизистой оболочки прямой кишки, вызывая усиление ее перистальтики и быструю эвакуацию каловых масс. Эффект наступает через 5–15 мин после применения суппозитория. Позывы к опорожнению кишечника прекращаются после акта дефекации. Препарат не вызывает растяжения стенок прямой кишки, укрепляет и тонизирует гладкую мускулатуру этого органа. При курсовом применении препарат восстанавливает дефекационный рефлекс и нормализует биоритм дефекации.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Симптоматическое лечение запора, включая привычный и хронический запор, гипотоническую дискинезию толстой кишки (например, у лежачих и пожилых пациентов). Препарат РектАктив® показан к применению у взрослых пациентов от 18 лет.

Противопоказания

Гиперчувствительность к Конского каштана обыкновенного семян экстракту или к любому из вспомогательных веществ, кишечная непроходимость, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, острый геморрой, острый проктит и парапроктит, спастический запор, опухоли и трещины прямой кишки, выраженное обезвоживание, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Препарат применяют ректально (вводят в прямую кишку) 1 раз в сутки за 5–15 мин до запланированного акта дефекации.

Чтобы вынуть суппозиторий из ячейковой упаковки, необходимо отломить одну ячейку с суппозиторием по насечке и, разведя края ленты, потянуть за них в разные стороны. Суппозиторий ввести в задний проход заостренным концом, по возможности глубоко. Для более удобного введения суппозитория рекомендуется нагнуться, присесть на корточки или лечь на бок, поджав ноги.

Разовая доза для взрослых – 50–100 мг в сутки; максимальная разовая доза – 300 мг; максимальная суточная доза – 300 мг. Длительность одного курса лечения препаратом 14 дней. Дальнейшее лечение препаратом возможно только после консультации с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможные побочные эффекты при применении препарата РектАктив® приведены в соответствии с классификацией, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения: очень часто ($> 1/10$), часто ($\geq 1/100$, но $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$, но $< 1/100$), редко ($\geq 1/10000$, но $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10000$), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны иммунной системы: частота неизвестна – аллергические реакции.

Общие нарушения и реакции в месте введения: частота неизвестна – кратковременное ощущение жжения в прямой кишке.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомом передозировки является частый жидкий стул. В данном случае следует прекратить применение препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Данные о случаях взаимодействия с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 2 недель или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 50 мг и 100 мг.

По 5 суппозиторияев упаковывают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии
потребителя**

ООО «Миллор Групп», Россия

117186, Москва, Нахимовский проспект, д. 22

Тел.: +7 (499) 390-50-45, 8 (800) 222-42-72

Адрес электронной почты: info@millor-group.ru

Производитель

ООО «Альтфарм», Россия

142073, Московская область, г. Домодедово, д. Судаково, тер. Лесное, стр. 10б

Тел.: (495) 234-46-40