ЛП-№(009106)-(РГ-RU) от 03.03.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2025 № 5401
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПРОТИВОГЕМОРРОИДАЛЬНЫЙ СБОР

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Противогеморроидальный сбор.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Кориандра посевного плоды + Крушины ольховидной кора + Сенны листья + Солодки корни + Тысячелистника обыкновенного трава.

Лекарственная форма.

Сбор-порошок.

Состав.

Кориандра посевного плоды	20 %
Крушины ольховидной кора	20 %
Сенны листья	20 %
Солодки корни	20 %
Тысячелистника обыкновенного трава	20 %

Описание.

Смесь частиц растительного сырья желтовато-зеленого цвета с беловатыми, сероватыми, желтовато-оранжевыми, коричневыми и темно-коричневыми вкраплениями. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения сладковатый, пряный.

Фармакотерапевтическая группа.

Противогеморроидальное средство растительного происхождения.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2025 № 5401
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Фармакологическое действие.

Настой сбора оказывает слабительное, спазмолитическое, гемостатическое действие.

Показания к применению.

Геморрой (регулирование стула), хронический запор.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, синдром «острого» живота, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 15 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем фильтр-пакеты отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1/2 – 1 стакану теплого настоя на ночь. Длительность применения обусловлена характером заболевания, достигнутым эффектом, характером сопутствующей терапии.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции; при длительном применении возможны запор, жажда, потеря массы тела, головная боль, боли в области сердца, гипокалиемия.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2025 № 5401
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

При передозировке в связи с выраженным послабляющим эффектом может наблюдаться потеря калия с симптомами гипокалиемии (утомляемость, мышечная слабость, мышечные боли, мышечные судороги). Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Препараты, содержащие в своем составе сенну, снижают абсорбцию тетрациклина. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в т.ч. безрецептурные), перед применением препарата «Противогеморроидальный сбор» проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания.

При длительном применении препарата возможно развитие привыкания к слабительным компонентам (крушины кора, сенны листья) и ослабление или отсутствие слабительного эффекта. Не рекомендуется длительный прием препарата без консультации врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Сбор-порошок. По 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°С.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2025 № 5401
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,

телефон +7 (495) 566-00-14, E-mail: sales@lektrava.ru