МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N000501/01- 010818
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Крапивы листья

(Urticae folia)

листья измельченные

ЗАО «Ст.-Медифарм», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» _____ 201_ г. 010818

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата **КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ (Urticae folia)**	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ (*Urticae folia*)**
Торговое название: Крапивы листья	**Торговое наименование:** Крапивы листья
Раздел отсутствует	**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Крапивы двудомной листья
Состав: Крапивы листья	**Состав:** Крапивы двудомной листья
Показания к применению: В качестве кровоостанавливающего средства при физиологических обильных менструальных кровотечениях, необильных кровотечениях в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки	**Показания к применению:** Обильные менструальные кровотечения в составе комплексной терапии, необильные кровотечения в посткоагуляционный период эрозии шейки матки
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, гиперкоагуляция, беременность. С осторожностью применять при почечной недостаточности	**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к препарату, гиперкоагуляция, кровотечения (при заболеваниях, требующих оперативного вмешательства, опухолях), беременность, детский возраст до 12 лет

Раздел отсутствует	**С осторожностью:** При почечной недостаточности
Применение в период лактации: Применение возможно после согласования с врачом	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Применение при беременности противопоказано. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом
Способ применения и дозы: Около 10 г (2 столовые ложки) крапивы листьев измельченных помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан)горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, затем охлаждают при комнатной температуре в течение 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Внутрь настой принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.	**Способ применения и дозы:** Около 10 г (2 столовые ложки) крапивы листьев измельченных помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, затем охлаждают при комнатной температуре в течение 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Настой принимают внутрь в теплом виде по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.
Побочные действия: Возможны аллергические реакции, гиперкоагуляция	**Побочное действие:** Возможны аллергические реакции, гиперкоагуляция. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.
Раздел отсутствует	**Передозировка:** Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.
Раздел отсутствует	**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** Не описано.

Раздел отсутствует	**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:** Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).
Условия хранения Хранить в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте. Настой - в прохладном месте не более 2-х суток.	**Условия хранения:** Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Настой - в прохладном месте не более 2-х суток.
Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.	**Срок годности:** 3 года. Не применять препарат по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек: Без рецепта	**Условия отпуска:** Отпускают без рецепта
Производитель/Организация, принимающая претензии ЗАО «Ст.-Медифарм», 125480, г. Москва, ул. Планерная 3, корп. 3 Тел/факс: 234-59-01, 496-71-20.	**Производитель/Организация, принимающая претензии:** ЗАО «Ст.-Медифарм», Россия, 125480, г. Москва, ул. Планерная, д.3, корп.3. Тел/факс: 234-59-01, 496-71-20. E-mail: info@st-medifarm.ru Internet: http://www.st-medifarm.ru Адрес производства: Россия, 357021, с. Веселое, Кочубеевский район, Ставропольский край.

Генеральный директор
ЗАО «Ст.-Медифарм» Ю.Н. Смирнов

Открытое акционерное общество «Ст.-Медифарм» №1 Для документов * Москва * 98053