ЛП-№(014759)-(РГ-RU) от 05.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.04.2026 № 8783
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АНУЗОНИДИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: АНУЗОНИДИН

Международное непатентованное или группировочное наименование: Красавки листьев экстракт + Висмута трибромфенолята и Висмута оксида комплекс + Цинка сульфат

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав

1 суппозиторий содержит:

Действующие вещества	
Красавки листьев экстракт густой (с содержанием суммы алкалоидов в пересчете на гиосциамин 1,5 %)	20,0 мг (0,3 мг)*
Висмута трибромфенолята и Висмута оксида комплекс (Ксероформ)	100,0 мг
Цинка сульфата гептагидрат	50,0 мг
Вспомогательные вещества	
Глицерол	120,0 мг
Вода очищенная	85,0 мг
Моноглицериды дистиллированные	37,0 мг
Жир твердый (Витепсол марки W35, Суппосир марки NAS 50)	До получения суппозитория массой 2250,0 мг

Описание: суппозитории торпедообразной формы зеленовато-желтого или зеленовато-желтого с коричневым оттенком, или светло-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа: ангиопротекторы; средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения; другие средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.

Код АТХ: C05AX03

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.04.2026 № 8783
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Фармакологические свойства

Противогеморроидальное комбинированное средство. Обладает болеутоляющим, местным противовоспалительным, спазмолитическим, антисептическим, вяжущим и подсушивающим действием.

Показания к применению

АНУЗОНИДИН показан к применению у взрослых для лечения геморроя, анальных трещин.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к трибромфеноляту висмута, комплексу оксида висмута экстракту листьев белладонны, сульфату цинка или к любому из вспомогательных веществ;
- Закрытоугольная глаукома или подозрение на глаукому;
- Хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;
- Тахикардия;
- Миастения;
- Обструктивные заболевания желудочно-кишечного тракта;
- Стеноз привратника,
- Атония кишечника,
- Активный язвенный колит;
- Доброкачественная гиперплазия предстательной железы;
- Беременность;
- Период грудного вскармливания;
- Возраст до 18 лет.

С осторожностью

Вегетативная нейропатия, гипертиреоз, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, митральный стеноз, заболевания почек, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит, повышение температуры тела (вероятность развития лихорадки и теплового удара вследствие подавления активности потовых желез).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано. В случае необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.04.2026 № 8783
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Способ применения и дозы

Ректально, после очистительной клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника. По 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки, максимальная суточная доза – 7 суппозиториев. Длительность курса лечения составляет 7-10 дней.

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы

Аллергические реакции.

Нарушения со стороны нервной системы

Головокружение, головная боль, нарушение сна, сонливость.

Нарушения со стороны органа зрения

Мидриаз, светобоязнь, парез аккомодации.

Нарушения со стороны сердца

Тахикардия, ощущение сердцебиения.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

Сухость слизистой оболочки полости рта, жажда, атония кишечника, запор, послабление стула, жжение в области заднего прохода.

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей

Задержка мочеиспускания.

Передозировка

Симптомы

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов, тошнота, рвота, снижение потоотделения, гипертермия; в более тяжелых случаях – психомоторное возбуждение, судороги, острая задержка мочеиспускания.

Лечение

Немедленная отмена препарата и соответствующая симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении с трициклическими антидепрессантами возможно усиление м-холиноблокирующих эффектов препарата (сухость во рту, нарушение аккомодации, тахикардия, запор и т. д.).

При применении с препаратами, повышающими частоту сердечных сокращений (в том числе прокаинамид) - возможна выраженная тахикардия.

Ингибиторы моноаминооксидазы (МАО) повышают риск развития побочных эффектов и усиливают положительный хроно- и батмотропный эффект; при совместном применении с сердечными гликозидами - усиление положительного батмотропного эффекта.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.04.2026 № 8783
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

При одновременном приеме с препаратами красавки (белладонны) этанола (алкоголя) возможно усиление тормозящего действия на центральную нервную систему (ЦНС).

Особые указания

Следует учитывать возможное проникновение алкалоидов красавки через гематоэнцефалический барьер и возможное взаимодействие с лекарственными средствами, влияющими на ЦНС. В терапевтических дозах алкалоиды красавки оказывают умеренное стимулирующее влияние на ЦНС, в больших дозах - возбуждающее действие, в токсических дозах - ажитацию, галлюцинации, сменяющиеся торможением и коматозным состоянием. Следует избегать одновременного назначения суппозиториев с экстрактом красавки и других препаратов с антихолинергической активностью, поскольку повышается вероятность развития побочных эффектов.

Красавки экстракт способствует снижению скорости всасывания совместно применяемых лекарственных и прочих средств вследствие угнетения моторной функции желудочно-кишечного тракта.

Вспомогательные вещества

Лекарственный препарат содержит глицерол (глицерин), который может оказывать слабое слабительное действие.

Форма выпуска

По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной.

1-10 контурных ячейковых упаковок по 5 суппозиториев вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.04.2026 № 8783
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.