

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Сорбо Плюс

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: Сорбо Плюс

Группировочное наименование: кремния диоксид коллоидный

Лекарственная форма: порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь

Состав:

В 1 г препарата содержится:

действующее вещество: кремния диоксид коллоидный – 1,0 г

Описание: легкий белый или белый с голубоватым оттенком порошок, без
запаха. При взбалтывании с водой образует суспензию от белого до почти
белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: противодиарейные, кишечные
противовоспалительные/противомикробные средства; кишечные адсорбенты

Код АТХ: A07B

Фармакологические свойства

Сорбо Плюс – неорганический, неселективный, полифункциональный
энтеросорбент на основе высокодисперсного кремнезема с размером частиц
до 0,09 мкм, с химической формулой SiO_2 . Удельная площадь поверхности
препарата порядка 300 м²/г. Емкость адсорбции препарата при употреблении
внутрь – не менее 220 мг/г.

Фармакодинамика

Сорбо Плюс обладает выраженными сорбционными и детоксикационными
свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и
выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества
различной природы, включая патогенные бактерии и бактериальные токсины,
антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых

металлов, радионуклиды, алкоголь. Сорбо Плюс сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза.

Фармакокинетика

Сорбо Плюс не расщепляется и не всасывается в желудочно-кишечном тракте и выделяется в неизменном виде.

Показания к применению

Препарат Сорбо Плюс показан к применению у взрослых и детей при:

- острых и хронических интоксикациях различного происхождения;
- острых кишечных инфекциях любого генеза, включая пищевые токсикоинфекции, а также диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз (в составе комплексной терапии);
- гнойно-септических заболеваниях, сопровождающихся выраженной интоксикацией;
- острых отравлениях сильнодействующими и ядовитыми веществами, в том числе лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжелых металлов и др.;
- пищевой и лекарственной аллергии;
- гипербилирубинемии (вирусный гепатит и другие желтухи) и гиперазотемии (хроническая почечная недостаточность);
- с целью профилактики жителям экологически неблагоприятных регионов и работникам вредных производств.

Противопоказания для применения

- Гиперчувствительность к кремния диоксиду коллоидному;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- кровотечения из желудочно-кишечного тракта;
- атония кишечника.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение Сорбо Плюс при беременности и в период грудного вскармливания не противопоказано.

Способ применения и дозы

Сорбо Плюс принимают внутрь только в виде водной суспензии!

Для получения суспензии необходимое количество препарата тщательно размешивают в $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ стакана воды. Рекомендуется готовить свежую суспензию перед каждым приемом препарата и выпивать ее за 1 час до еды или приема других лекарств.

Средняя суточная доза у взрослых 0,1-0,2 г на 1 кг массы тела (6-12 г).

Препарат принимается в 3-4 приема в течение суток.

Максимальная суточная доза у взрослых 0,33 г на 1 кг массы тела (20 г).

Доза для детей рассчитывается в зависимости от массы тела (см. таблицу).

Таблица рекомендуемых доз препарата Сорбо Плюс

Вес пациента	Дозировка	Объем воды
до 10 кг	0,5 – 1,5 чайные ложки в сутки	30-50 мл
11-20 кг	1 чайная ложка «без горки» на 1 прием	30-50 мл
21-30 кг	1 чайная ложка «с горкой» на 1 прием	50-70 мл
31-40 кг	2 чайные ложки «с горкой» на 1 прием	70-100 мл
41-60 кг	1 столовая ложка «с горкой» на 1 прием	100 мл
более 60 кг	1-2 столовые ложки «с горкой» на 1 прием	100-150 мл

1 чайная ложка «с горкой» - 1 г препарата,

1 столовая ложка «с горкой» - 2,5-3 г препарата.

Срок хранения суспензии не более 48 часов.

В случаях пищевой аллергии препарат принимается непосредственно перед приемом пищи, суточную дозу Сорбо Плюс разделяют в течение дня на три приема.

Длительность лечения зависит от диагноза и тяжести заболевания, курс лечения при острых интоксикациях 3-5 дней; при аллергических

заболеваниях, хронических интоксикациях продолжительность лечения до 10-14 дней. Повторные курсы спустя 2-3 недели, по рекомендации врача.

Особенности применения Сорбо Плюс при различных заболеваниях

Пищевая интоксикация и острые отравления

Начинать терапию рекомендуется с промывания желудка 0,5-1 % суспензией Сорбо Плюс. При тяжелых отравлениях в первые сутки промывание желудка проводят через зонд каждые 4-5 часов, наряду с этим препарат дают внутрь. Разовая доза у взрослых может составлять 0,1-0,15 г/кг массы тела пациента по 2-3 раза в день.

Острые кишечные инфекции

Рекомендуется начать лечение Сорбо Плюсом в первые часы или сутки заболевания в комплексе с другими способами лечения. В первые сутки суточная доза дается в течение 5-ти часов с интервалами между приемами в 1 час. Во 2-е сутки суточная доза дается в 4 приема в течение суток. Продолжительность лечения – 3-5 дней.

Лечение вирусного гепатита

В комплексной терапии вирусного гепатита Сорбо Плюс применяют как детоксицирующее средство в обычных дозах в течение первых 7-10 дней болезни.

Аллергические заболевания

При острых аллергических реакциях лекарственного или пищевого генеза рекомендуется предварительное промывание желудка и кишечника 0,5-1 % суспензией Сорбо Плюс. Затем препарат дают в обычных дозах до наступления клинического эффекта. При хронических пищевых аллергиях рекомендуются курсы Сорбо Плюс по 7-10-15 дней, препарат принимают непосредственно перед едой. Аналогичные курсы показаны при острой рецидивирующей крапивнице и отеке Квинке, эозинофилии накануне на фоне обострения поллинозов и других атопий.

Хроническая почечная недостаточность

Используют курсы лечения Сорбо Плюсом в суточной дозе 0,15-0,2 г/кг тела в течение 25-30 дней с перерывом 2-3 недели.

Побочное действие

Для определения частоты возникновения побочных эффектов препарата применяют следующую классификацию: очень часто ($> 1/10$); часто ($> 1/100$ и $< 1/10$); нечасто ($> 1/1000$ и $< 1/100$); редко ($> 1/10000$ и $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$); частота неизвестна (не может быть установлена на основании имеющихся данных).

Со стороны иммунной системы:

Редко: аллергические реакции.

Со стороны желудочно-кишечного тракта:

Редко: диспепсия, запоры.

При длительном, более 14 дней, приеме Сорбо Плюса возможно нарушение всасывания витаминов, кальция в связи с чем рекомендуется профилактический прием поливитаминных препаратов, кальция.

Передозировка

Случаев передозировки при применении кремния диоксида коллоидного в рекомендуемых терапевтических дозах не выявлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно снижение лечебного эффекта одновременно принимаемых внутрь лекарств.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Не отмечено влияния кремния диоксида коллоидного на способность управлять транспортными средствами или другими потенциально опасными механизмами.

Форма выпуска

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

По 12/25/50 г в банки из полипропилена, укупоренные крышками из

аналогичного материала с индукционными вкладышами.

На банку наклеивают этикетку из бумаги писчей или этикеточной, или этикетки самоклеящиеся.

По 1 банке вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

После вскрытия упаковки хранить в плотно закрывающейся емкости.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Б-ФАРМ», Россия

Юридический адрес: 143026, Московская область, г. о. Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, стр. 2А, ком. 2.

Почтовый адрес: 121309, г. Москва, а/я 15.

Тел.: +7 (499) 145-59-99, тел. Горячей линии: +7 (926) 601-20-45.

e-mail: inbox@b-pharm.ru

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Юридический адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Адрес места производства лекарственного препарата: Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.