

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КРУШИНЫ КОРА
Frangulae alni cortex

Регистрационный номер.

Торговое наименование. Крушины кора.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Крушины ольховидной кора.

Лекарственная форма. Кора измельченная.

Состав. Крушины ольховидной кора.

Характеристика.

Кора крушины содержит антрагликозиды и другие биологически активные вещества.

Описание.

Смесь кусочков коры различной формы. Цвет коры с наружной стороны темно-коричневый, серо-коричневый, темно-серый или серый, с внутренней – желтовато-оранжевый или красновато-коричневый. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа.

Слабительное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Отвар коры крушины оказывает слабительное действие, обусловленное наличием антрагликозидов, вызывающих раздражение рецепторов слизистой оболочки толстого кишечника. Слабительный эффект обычно наступает через 8-12 часов после приема препарата.

Показания к применению.

Хронический запор.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, синдром острого живота, аппендицит, энтерит, колит, метроррагия, острые лихорадочные состояния; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

Около 12 г (2 столовые ложки) коры крушины помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане при частом помешивании 30 минут, охлаждают при комнатной температуре 10 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Отвар принимают внутрь в теплом виде взрослые и дети старше 12 лет по 1/2 стакана на ночь и утром. Курс лечения 1-2 недели.

Перед применением отвар рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), ощущение дискомфорта в животе (метеоризм, спастические боли, тошнота).

Передозировка.

При передозировке возможны коликообразные боли в животе, тенезмы, тошнота, рвота, диарея. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

При длительном применении препаратов крушины может развиваться привыкание и ослабление или отсутствие слабительного эффекта, поэтому целесообразно чередовать их с другими слабительными средствами. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, не требующее отмены препарата. Не рекомендуется длительный прием препарата без консультации врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Кора измельченная. По 25 г, 30 г, 35 г, 50 г, 100 г коры измельченной в пачках из картона с контролем первого вскрытия с внутренним пакетом из бумаги с термосвариваемым пропиленовым слоем или бумаги с термосвариваемым полиэтиленовым слоем, или материала комбинированного многослойного, или полипропилена.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции по применению наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный отвар – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества): Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25