

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КРУШИНЫ КОРА

Frangulae alni cortex

Регистрационный номер.

Торговое наименование. Крушины кора.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Крушины ольховидной кора.

Лекарственная форма. Кора порошок.

Состав. Крушины ольховидной кора.

Характеристика.

Кора крушины содержит антрагликозиды и другие биологически активные вещества.

Описание.

Смесь частиц коры желтовато-коричневого цвета с коричневыми, темно-коричневыми, серо-коричневыми, темно-серыми, серыми, желтовато-оранжевыми, красновато-коричневыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа.

Слабительное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой коры крушины оказывает слабительное действие, обусловленное наличием антрагликозидов, вызывающих раздражение рецепторов слизистой оболочки толстого кишечника. Слабительный эффект обычно наступает через 8-12 часов после приема препарата.

Показания к применению.

Хронический запор.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, синдром острого живота, аппендицит, энтерит, колит, метроррагия, острые лихорадочные состояния; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

4 фильтр-пакета (6,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 15 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Настой принимают внутрь в теплом виде взрослые и дети старше 12 лет по 1/2 стакана на ночь и утром. Курс лечения 1-2 недели.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), ощущение дискомфорта в животе (метеоризм, спастические боли, тошнота).

Передозировка.

При передозировке возможны коликообразные боли в животе, тенезмы, тошнота, рвота, диарея. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

При длительном применении препаратов крушины может развиваться привыкание и ослабление или отсутствие слабительного эффекта, поэтому целесообразно чередовать их с другими слабительными средствами. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, не требующее отмены препарата. Не рекомендуется длительный прием препарата без консультации врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Кора порошок. По 1,5 г коры порошка в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов вкладывают в пачки из картона. Пачки с фильтр-пакетами заворачивают в пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции по применению наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества):

Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25