

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

КРУШИНЫ КОРА

(Frangulae cortex)

Регистрационный номер № ЛС-000087

Торговое наименование

Крушины кора.

Международное непатентованное или группировочное наименование

Крушины ольховидной кора.

Лекарственная форма

Кора-порошок.

Состав

Крушины ольховидной кора.

Характеристика

Кора крушины содержит антрагликозиды (франгулин, глюкофрангулин, франгулаэмодин), хризофановую кислоту, дубильные вещества, органические кислоты, эфирное масло, сахара, алкалоиды и другие биологически активные вещества.

Описание

Смесь частиц коры желтовато-коричневого цвета с коричневыми, темно-коричневыми, серо-коричневыми, темно-серыми, серыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Настой коры крушины оказывает слабительное действие, обусловленное наличием антрагликозидов, вызывающих раздражение рецепторов слизистой оболочки толстого кишечника. Слабительный эффект обычно наступает через 8-12 часов после приема препарата.

Показания к применению

Хронический запор.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, синдром острого живота, аппендицит, энтерит, колит, метроррагия, острые лихорадочные состояния. Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

3 фильтр-пакета (6,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают крышкой и настаивают в течение 15 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1/2 стакана на ночь и утром. Курс лечения – 2-3 недели.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшение не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), ощущение дискомфорта в животе (метеоризм, спастические боли, тошнота). Если указанные в инструкции нежелательные реакции усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: коликообразные боли в животе, тенезмы, тошнота, рвота, диарея.
Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

При длительном применении препаратов крушины может развиваться привыкание и ослабление или отсутствие слабительного эффекта, поэтому целесообразно чередовать их с другими слабительными средствами. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, не требующее отмены препарата. Не рекомендуется длительный прием препарата без консультации врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Кора-порошок.

По 2,0 г коры-порошка в фильтр-пакеты, изготовленные из бумаги

термосвариваемой пористой неразмокаемой, закрытые методом термосваривания.

По 20 фильтр-пакетов помещают в пачку картонную из картона для потребительской тары, или картона тароупаковочного, или картона типа «хром-эрзац».

Картонную пачку с фильтр-пакетами упаковывают в пленку полипропиленовую двухосноориентированную, с целью контроля первого вскрытия.

Текст инструкции по медицинскому применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке).

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО)

Россия, 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Парковая, 57.

Телефон: 8-800-200-67-17

www.fitofarm.ru

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей

ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО)

Россия, 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Парковая, 57.

Телефон: 8-800-200-67-17

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.06.2023 № 12152
(Входящий МЗ №4201671)