ЛП-№(012780)-(РГ-RU) от 10.12.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.12.2025 № 30419
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КРУШИНЫ СИРОП

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Крушины сироп

Международное непатентованное или группировочное наименование: Крушины ольховидной коры экстракт

Лекарственная форма: сироп

Состав

Для приготовления 1000 г препарата используются:

Крушины кора измельченная	–	415 г
Вода очищенная	–	до получения 500 мл экстракта
Сахар (сахароза)	–	500 г

Описание

Жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения запоров; контактные слабительные средства.

Код АТХ

A06AB07.

Фармакологические свойства

Оказывает слабительное действие, наступающее через 8-12 ч после приема. Слабительный эффект обусловлен наличием антраценпроизводных гликозидов, вызывающих раздражение рецепторов слизистой оболочки толстого кишечника.

Показания к применению

В качестве слабительного средства при хронических запорах.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, острые воспалительные заболевания кишечника (энтерит, колит), метроррагия, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, детский возраст до 3 лет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.12.2025 № 30419
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. В период грудного вскармливания и пациентам с паренхиматозными поражениями почек и печени.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности противопоказано.

Применение препарата в период грудного вскармливания возможно по назначению врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет – по 5-10 мл (1-2 чайные ложки) сиропа 1-2 раза в день, максимальная разовая доза – 15 мл (3 чайные ложки); детям, в зависимости от возраста, 1 раз в день перед сном: 3-5 лет – по 1,25 мл (1/4 чайной ложки); 5-9 лет – по 2,5-5 мл (1/2-1 чайная ложка); 9-12 лет – по 5-7,5 мл (1-1,5 чайные ложки). Курс лечения без консультации врача не более 2-х недель.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), абдоминальные боли, диспепсические явления, окрашивание мочи в желтый цвет (из-за наличия хризофановой кислоты), что не требует отмены препарата.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано.

Особые указания

При длительном применении препарата развивается привыкание, в связи с чем его прием целесообразно чередовать с другими слабительными средствами. Перед назначением препарата необходимо установить генез нарушений функции кишечника.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.12.2025 № 30419
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что одна чайная ложка сиропа (5 мл) содержит 3,2 г сахара (0,27 ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Сироп.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

По 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата с колпачками системы контроля первого вскрытия, прозрачные, коричневого цвета.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.12.2025 № 30419
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.