ЛП-№(012344)-(РГ-RU) от 05.11.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.10.2025 № 27206
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПРОЛАКСАНИТ®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ПРОЛАКСАНИТ®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Крушины ольховидной коры экстракт

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав на одну таблетку

Активный компонент

Крушины экстракт сухой с содержанием суммы антраценпроизводных в пересчете на франгулаэмодин и сухое вещество 2,0 % (Спецификация фирмы)	– 0,20 г

Вспомогательные вещества ядра

Крахмал картофельный	– 0,00625 г
Кальция стеарат	– 0,00125 г
Тальк	– 0,00125 г
Сахар (сахароза)	– 0,00100 г
Натрия гидрокарбонат	– 0,00025 г

Вспомогательные вещества оболочки

Сахар (сахароза)	– 0,09431 г
Магния карбонат основной (магния гидроксикарбонат)	– 0,01908 г
Тальк	– 0,00161 г
Аэросил (кремния диоксид коллоидный)	– 0,00160 г
Поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский (повидон)	– 0,00160 г
Титана диоксид	– 0,00160 г
Вазелиновое масло (парафин жидкий)	– 0,00010 г
Воск пчелиный	– 0,00010 г

Описание

Таблетки круглые двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения запоров; контактные слабительные средства.

Код АТХ

A06AB07.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.10.2025 № 27206
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Слабительное действие обусловлено антрагликозидами и хризофановой кислотой, воздействующими на рецепторы толстого кишечника и усиливающими его перистальтику. Слабительный эффект наступает через 8-12 ч.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Хронический запор.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, острые воспалительные заболевания кишечника (энтерит, колит), метроррагия, запор неврогенного и эндокринного происхождения, спастический запор, кишечная непроходимость, синдром острого живота, аппендицит, острые лихорадочные состояния, беременность, период грудного вскармливания, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь.

По 1-2 таблетки перед сном. Курс лечения 1-2 недели.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.10.2025 № 27206
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь); ощущение дискомфорта в животе (метеоризм, спастические боли, тошнота).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Возможны коликообразные боли в животе, тенезмы, тошнота, рвота, диарея.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Если Вы применяете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата ПРОЛАКСАНИТ® проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Не рекомендуется длительный прием препарата без консультации врача.

При длительном применении препарата может развиться привыкание, в связи с чем его прием целесообразно чередовать с другими слабительными средствами.

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,102 г углеводов (0,0085 ХЕ).

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет (из-за наличия хризофановой кислоты), что не опасно для организма и не требует отмены препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата ПРОЛАКСАНИТ® не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг.

По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

2, 4 или 5 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 1, 2 контурные ячейковые упаковки по 20 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.10.2025 № 27206
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14

Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес электронной почты: vifiteh@mail.ru