ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ

Регистрационный номер:

Торговое название: Ксантинола никотинат

МНН: Ксантинола никотинат

Лекарственная форма: раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Состав:

В 1 мл препарата содержится:

активное вещество: ксантинола никотинат – 150 мг

вспомогательное вещество: вода для инъекций

Описание: Бесцветная прозрачная жидкость

Фармакотерапевтическая группа: вазодилатирующее средство

Код АТХ: C04AD02

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Ксантинола никотинат сочетает свойства лекарственных средств группы теофиллина и никотиновой кислоты: оказывает антиагрегантное действие, расширяет периферические сосуды, улучшает коллатеральное кровообращение. Блокируя аденозиновые рецепторы и фосфодиэстеразу, увеличивает содержание циклического аденозинмонофосфата в клетке, субстратно стимулирует синтез никотинамиддинуклеотида и никотинамиддинуклеотидфосфата. Улучшает микроциркуляцию,

оксигенацию и питание тканей, при продолжительном применении оказывает антиатеросклеротическое действие, активирует процессы фибринолиза, снижает концентрацию холестерина и атерогенных липидов, усиливает активность липопротеинлипазы, уменьшает вязкость крови, снижает агрегацию тромбоцитов.

Уменьшая общее периферическое сосудистое сопротивление и усиливая сокращения миокарда, способствует увеличению минутного объема крови и усилению мозгового кровообращения, уменьшает выраженность последствий церебральной гипоксии.

Ксантинола никотинат вызывает «никотиноподобный» синдром, сопровождающийся гиперестезией слизистой оболочки полости носа и рта: обостряет чувствительность обонятельных и вкусовых ощущений. В связи с этим запах и вкус предлагаемых во время «никотиноподобной» реакции алкогольных напитков воспринимается более резким и неприятным.

Показания к применению

В составе комплексной терапии: облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит, диабетическая ангиопатия, острый тромбофлебит (поверхностных и глубоких вен), трофические язвы голеней, цереброваскулярная недостаточность, атеросклероз сосудов головного мозга, нарушения мозгового кровообращения, атеросклероз коронарных артерий, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия.

Противопоказания

Гиперчувствительность, острая сердечная недостаточность или декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, острое кровотечение, острый инфаркт миокарда, митральный стеноз, язвенная

болезнь желудка и 12-перстной кишки (в фазе обострения), артериальная гипотензия, острая почечная недостаточность, глаукома. Не применять совместно с ингибиторами моноаминооксидазы.

С осторожностью

Во время беременности и в период лактации применение препарата допустимо только при наличии абсолютных показаний и тщательном наблюдении врача.

Способ применения и дозы

Внутривенно (струйно или капельно), внутримышечно.

При острых нарушениях кровообращения ксантинола никотинат вводят внутримышечно по 300 мг (2 мл) 1-3 раза в сутки. В зависимости от характера заболевания доза может быть постепенно увеличена до 600 мг (4 мл) 2-3 раза в сутки. Длительность терапии определяется врачом, в среднем составляет 2-3 недели.

В условиях стационара ксантинола никотинат вводят внутривенно струйно – по 300 мг (2 мл) 1–2 раза в день в течение 5–10 дней. Больной при этом должен находиться в горизонтальном положении.

Препарат можно вводить внутривенно капельно со скоростью 40-50 капель в минуту в течение 1,5-4 часов. Для этого разовую дозу препарата разводят в 200-500 мл 5 % раствора декстрозы или в 200 мл 0,9 % раствора натрия хлорида.

Побочное действие

Снижение артериального давления, жар, гиперемия кожных покровов, слабость, головокружение, тошнота, диарея, снижение аппетита, гастралгия. При длительном назначении в высоких дозах – изменение толерантности к глюкозе, повышение

активности «печеночных» трансаминаз щелочной фосфатазы, гиперурикемия.

Передозировка

Симптомы: снижение артериального давления, боль в животе, рвота.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Следует соблюдать осторожность при одновременном назначении ксантинола никотината и гипотензивных лекарственных средств (бета-адреноблокаторов, алкалоидов спорыньи, альфа-адреноблокаторов, симпатолитиков, ганглиоблокаторов), а также строфантина (строфантина-К) (возможно резкое усиление их действия).

Особые указания

Большие дозы препарата могут вызывать головокружение, слабость и артериальную гипотензию, в связи с этим следует воздержаться от управления автотранспортным средством и работы с механизмами.

Избегать попадания в глаза или на слизистые оболочки.

Форма выпуска

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 150 мг/мл.

По 2 мл в ампулы нейтрального стекла марки НС-3 или УСП-1. По 10 ампул помещают в коробки из картона. В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению и скарификатор ампульный.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель/Организация, принимающая претензии

ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко»

ул. Б. Каменщики, д. 9, г. Москва, 115172

тел/факс (495) 912-71-61

Зам. Генерального директора
ОАО «Мосхимфармпрепараты»
им. Н. А. Семашко» А.А. Трифонов

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА

54846