ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата ГРИППОСТАД® РИНО

Регистрационный номер

Торговое название препарата Гриппостад® Рино

Международное непатентованное название Ксилометазолин

Лекарственная форма Капли назальные [для детей]

Состав

1 мл раствора содержит в качестве активного вещества: ксилометазолина гидрохлорид – 0,5 мг, и вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 50% раствор, лимонная кислота моногидрат, натрия цитрат дигидрат, глицерин 85% (глицерол), вода очищенная.

Описание

Прозрачный бесцветный до слегка окрашенного раствор, свободный от видимых посторонних частиц, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Противоконгестивное средство – вазоконстриктор (альфа-адреномиметик)

Код АТХ: [R01AA07]

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Ксилометазолин – производное имидазолина, является альфа2-адреностимулятором. Суживает кровеносные сосуды слизистой оболочки полости носа, в результате чего уменьшается отек и гиперемия слизистой оболочки. Облегчает носовое дыхание при ринитах. Действие наступает через 5-10 минут и продолжается до 10 часов.
Не нарушает функцию реснитчатого эпителия слизистой дыхательных путей.

Фармакокинетика

При местном применении практически не всасывается, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

Показания к применению

Острый аллергический ринит, острые респираторные заболевания с явлениями ринита, синусит, поллиноз, средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки). Подготовка пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, тиреотоксикоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе).

С осторожностью применять при сахарном диабете, феохромоцитоме, ишемической болезни сердца (стенокардии), гиперплазии предстательной железы, в период лактации, детский возраст до 2-х лет.

Способ применения и дозы

Интраназально. Для грудных детей и детей в возрасте до 6 лет - по 1-2 кап 0,05% раствора в каждый носовой ход 1 или 2 раза в день; не следует применять более 3 раз в день.

Гриппостад® Рино не должен использоваться дольше, чем 5 дней, за исключением предписанных врачом случаев. Повторное использование препарата возможно через несколько дней. Длительность терапии определяет врач.

Побочное действие

При частом (более 4 раз в день) и/или длительном применении (более 7 дней) - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чиханье, гиперсекреция.

Редко – отек слизистой оболочки полости носа, сердцебиение, тахикардия, аритмии, повышение артериального давления, головная боль, рвота, бессонница, нарушение зрения, депрессия.

Передозировка

При правильном применении препарата передозировка препарата невозможна, т.к. препарат при местном применении практически не всасывается. Однако при превышении рекомендуемых доз в несколько раз наблюдается усиление побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие

Несовместим с ингибиторами моноаминооксидазы и трициклическими антидепрессантами.

Особые указания

Перед применением необходимо очистить носовые ходы.
Не следует применять в течение длительного времени (более 7 дней), например, при хроническом рините.

Форма выпуска

Гриппостад® Рино, капли назальные 0,05% по 10 мл во флаконы из стекла янтарного цвета с полипропиленовой завинчивающейся крышкой, снабженной пипеткой. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

Срок годности

4 года. Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

«ШТАДА Арцнаймиттель АГ», Германия

Штадаштрассе 2- 18

D-61118 Бад Фильбель, Германия

тел (+49) 6101-60 30

факс (+49) 6101-60 32 59

Интернет: http// www.stada.de

Маркетинг и дистрибуция ОАО «Нижфарм»

603950, Россия, Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

тел (8312) 278-80-88

факс (8312) 430-72-28

Интернет: http://www.nizhpharm.ru

И.о.директора ИДКЭЛС А.Н.Васильев

Представитель фирмы А.В.Бугров