МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ДЛЯНО®С

наименование лекарственного препарата

капли назальные для детей 0,05 %

лекарственная форма, дозировка

Сандоз Прайвит Лимитед, Индия

название фирмы-производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 271113 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
С осторожностью: Сахарный диабет, заболевания сердечнососудистой системы, гиперплазия предстательной железы, при повышенной чувствительности к адренергическим препаратам, сопровождающейся симптомами бессонницы, головокружения, сердечной аритмии, тремора, повышенного артериального давления.	**С осторожностью:** Сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, гиперплазия предстательной железы, при повышенной чувствительности к адренергическим препаратам, сопровождающейся симптомами бессонницы, головокружения, сердечной аритмии, тремора, повышенного артериального давления.
Побочное действие: Классификация частоты возникновения побочных реакций: очень часто — более 1/10 назначений (≥ 10 %); часто — более 1/100, но менее 1/10 назначений (≥ 1 %, но ≤ 10 %); нечасто — более 1/1000, но менее 1/100 назначений (≥ 0,1 %, но ≤ 1 %); редко — более 1/10000, но менее 1/1000 назначений (≥ 0,01 %, но ≤ 0,1 %); очень редко — менее 1/10000 назначений (≤ 0,01 %). Со стороны иммунной системы: Очень редко: реакции гиперчувствительности (ангионевротический отек, сыпь, зуд); Со стороны нервной системы: Часто: головная боль; Редко: бессонница, депрессия (при длительном применении в высоких дозах); Со стороны органов чувств: Очень редко: нарушение четкости	**Побочное действие:** Классификация частоты возникновения побочных эффектов (ВОЗ): очень часто >1/10; часто от >1/100 до < 1/10; нечасто от > 1/1000 до < 1/100; редко от >1/10000 до < 1/1000; очень редко от < 1/10000, включая отдельные сообщения. Со стороны иммунной системы: Очень редко: реакции гиперчувствительности (ангионевротический отек, сыпь, зуд); Со стороны нервной системы: Часто: головная боль; Редко: бессонница, депрессия (при длительном применении в высоких дозах); Со стороны органов чувств: Очень редко: нарушение четкости зрительного восприятия; Со стороны сердечно-сосудистой системы: Редко: ощущение сердцебиения, повышение артериального давления;

Старая редакция	Новая редакция
зрительного восприятия; Со стороны сердечнососудистой системы: Редко: сердцебиение, повышение артериального давления; Очень редко: аритмия, тахикардия; Со стороны дыхательной системы: Часто: раздражение или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чихание, гиперсекреция слизистой оболочки носоглотки; Со стороны пищеварительной системы: Часто: тошнота; Редко: рвота; Местные реакции: Часто: ощущение жжения в месте применения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.	Очень редко: аритмия, тахикардия; Со стороны дыхательной системы: Часто: раздражение или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чихание, гиперсекреция слизистой оболочки носоглотки; Со стороны пищеварительной системы: Часто: тошнота; Редко: рвота; Местные реакции: Часто: ощущение жжения в месте применения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.
Передозировка: Симптомы: усиление побочных эффектов, в частности, учащение пульса, повышение артериального давления, иногда может наблюдаться спутанность сознания. Лечение симптоматическое, под контролем врача.	**Передозировка:** Симптомы: усиление побочных эффектов, в частности, тахикардия, аритмия, повышение артериального давления, иногда может наблюдаться спутанность сознания. Лечение симптоматическое, под контролем врача.

Специалист по регистрации
ООО «Новартис Консьюмер Хелс»

«Новартис Консьюмер Хелс» Novartis Consumer Health LLC ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

С.А. Курашова