МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-001336-190421
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Носолин®-бальзам

наименование лекарственного препарата

капли назальные 0,1%

лекарственная форма, дозировка

ООО «Фирн М», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения изменения «____» 190421 20__г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению: – острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка); – острый аллергический ринит; – поллиноз; – синусит; – средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки); – для подготовки пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.	**Показания к применению:** Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), острый аллергический ринит, поллиноз, синусит, евстахиит, средний отит (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки). Подготовка пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.
Противопоказания: Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, воспалительные заболевания кожи и слизистой оболочки преддверия носа,	**Противопоказания:** Гиперчувствительность к ксилометазолину или любому из вспомогательных веществ препарата; артериальная гипертензия; тахикардия; выраженный атеросклероз; глаукома; гипертиреоз; атрофический ринит; воспалительные заболевания кожи

Старая редакция	Новая редакция
детский возраст до 18 лет, беременность, тиреотоксикоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), состояние после транссфеноидальной гипофизэктомии. Не применять при терапии ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) и трициклическими антидепрессантами, а также с другими препаратами, повышающими артериальное давление.	или слизистой оболочки преддверия носа; хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе); состояние после транссфеноидальной гипофизэктомии; беременность; применение ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) (включая 14 дней после их отмены); трициклических или тетрациклических антидепрессантов; детский возраст до 6 лет.
С осторожностью: Период грудного вскармливания, ИБС (стенокардия), феохромоцитома, гиперплазия предстательной железы, гипертиреоз, сахарный диабет, порфирия, повышенная чувствительность к адренергическим препаратам, сопровождающаяся головокружением, тремором, бессонницей, аритмией, повышением артериального давления.	**С осторожностью:** Сахарный диабет; тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (в т.ч. ишемическая болезнь сердца, стенокардия); гиперплазия предстательной железы; феохромоцитома; порфирия; период грудного вскармливания; повышенная чувствительность к адренергическим препаратам, сопровождающаяся бессонницей, головокружением, аритмией, тремором, повышением артериального давления; пациенты с синдромом удлиненного интервала QT.
Способ применения и дозы: Интраназально. По 1-2 капли в каждый носовой ход 0,1% раствора, не более 3 раз в сутки. Не следует применять препарат без перерыва более 5-7 дней.	**Способ применения и дозы:** Интраназально. У детей старше 6 лет и взрослых: по 2-3 капли в каждый носовой ход 0,1% раствора 2-3 раза в сутки. Не следует применять препарат более 3-х раз в сутки. Не рекомендуется применение лекарственного препарата более 5-7 дней. Препарат у детей следует применять под наблюдением взрослых. По поводу

Старая редакция	Новая редакция
	длительности применения у детей следует советоваться с врачом.
Особые указания: Перед применением препарата необходимо очистить носовые ходы. Не следует превышать *рекомендованные* дозы и применять препарат *непрерывно* в течение более 7 дней. Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение и отёк слизистой оболочки носа. При длительном применении препарата (более 7 дней) возможно ослабление терапевтического эффекта и возникновение риска реактивной гиперемии (медикаментозный ринит), а также атрофии слизистой оболочки носа.	**Особые указания:** Перед применением препарата необходимо очистить носовые ходы. Не следует превышать *рекомендованные* дозы и применять препарат *непрерывно* в течение более 7 дней. Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение и отёк слизистой оболочки носа. При длительном применении препарата (более 7 дней) возможно ослабление терапевтического эффекта и возникновение риска реактивной гиперемии (медикаментозный ринит), а также атрофии слизистой оболочки носа. Пациенты с синдромом удлиненного интервала QT, применяющие ксилометазолин, могут быть подвержены повышенному риску развития серьезных желудочковых аритмий.

Генеральный директор Н.Е. Кириллов