МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003420- 21 12 16
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Ксилометазолин – СОЛОфарм
наименование лекарственного препарата
спрей назальный дозированный 35 мкг/доза и 140 мкг/доза
лекарственная форма, дозировка
ООО «Гротекс», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 21 12 16 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **Ксилометазолин – СОЛОфарм**	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **СОЛОксилометазолин**
Торговое наименование: Ксилометазолин – СОЛОфарм	**Торговое наименование:** СОЛОксилометазолин
Противопоказания - повышенная чувствительность к компонентам препарата; - артериальная гипертензия; - тахикардия; - выраженный атеросклероз; - глаукома; - атрофический ринит; - тиреотоксикоз; - хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе); - состояния после трансфеноидальной гипофизэктомии; - детский возраст до 2 лет - для Ксилометa-	**Противопоказания** - повышенная чувствительность к компонентам препарата; - артериальная гипертензия; - тахикардия; - выраженный атеросклероз; - глаукома; - атрофический ринит; - тиреотоксикоз; - хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе); - состояния после трансфеноидальной гипофизэктомии; - детский возраст до 2 лет - для СОЛОкси-

золин – СОЛОфарм, спрей назальный дозированный 35 мкг/доза; - детский возраст до 6 лет - для Ксилометазолин – СОЛОфарм, спрей назальный дозированный 140 мкг/доза; - беременность. Не применять при терапии ингибиторами моноаминоксидазы и трициклическими антидепрессантами (включая период 14 дней после их отмены).	лометазолин, спрей назальный дозированный 35 мкг/доза; - детский возраст до 6 лет - для СОЛОксилометазолин, спрей назальный дозированный 140 мкг/доза; - беременность. Не применять при терапии ингибиторами моноаминоксидазы и трициклическими антидепрессантами (включая период 14 дней после их отмены).
Способ применения и дозы Интраназально (в каждый носовой ход). *Детям в возрасте от 2 до 6 лет:* по 1 впрыскиванию Ксилометазолин – СОЛОфарм, спрей назальный дозированный 35 мкг/доза в каждый носовой ход; не следует применять более 3-х раз в день. *Взрослым и детям старше 6 лет:* по 1 впрыскиванию Ксилометазолин – СОЛОфарм, спрей назальный дозированный 140 мкг/доза в каждый носовой ход (при необходимости можно повторить); не следует применять более 3-х раз в день. Если симптомы усиливаются или улучшение не наступает в течение 3-х дней, необходимо проконсультироваться с врачом. В рекомендованной дозе без консультации с врачом применять не более 7 дней. Дозы выше рекомендованных можно применять только под наблюдением врача. При частом и длительном использовании препарата ощущение «заложенности» носа может появиться вновь или ухудшиться. При появлении этих симптомов следует	**Способ применения и дозы** Интраназально (в каждый носовой ход). *Детям в возрасте от 2 до 6 лет:* по 1 впрыскиванию СОЛОксилометазолин, спрей назальный дозированный 35 мкг/доза в каждый носовой ход; не следует применять более 3-х раз в день. *Взрослым и детям старше 6 лет:* по 1 впрыскиванию СОЛОксилометазолин, спрей назальный дозированный 140 мкг/доза в каждый носовой ход (при необходимости можно повторить); не следует применять более 3-х раз в день. Если симптомы усиливаются или улучшение не наступает в течение 3-х дней, необходимо проконсультироваться с врачом. В рекомендованной дозе без консультации с врачом применять не более 7 дней. Дозы выше рекомендованных можно применять только под наблюдением врача. При частом и длительном использовании препарата ощущение «заложенности» носа может появиться вновь или ухудшиться. При появлении этих симптомов следует

прекратить лечение и обратиться к врачу. Одно впрыскивание объемом 70 мкл содержит 35 мкг ксилометазолина гидрохлорида – для Ксилометазолин – СОЛОфарм, спрей назальный дозированный 35 мкг/доза. Одно впрыскивание объемом 140 мкл содержит 140 мкг ксилометазолина гидрохлорида – для Ксилометазолин – СОЛОфарм, спрей назальный дозированный 140 мкг/доза.	прекратить лечение и обратиться к врачу. Одно впрыскивание объемом 70 мкл содержит 35 мкг ксилометазолина гидрохлорида – для СОЛОксилометазолин, спрей назальный дозированный 35 мкг/доза. Одно впрыскивание объемом 140 мкл содержит 140 мкг ксилометазолина гидрохлорида – для СОЛОксилометазолин, спрей назальный дозированный 140 мкг/доза.

Начальник отдела регистрации
ООО «Гротекс» С. В. Сергеев

Общество с ограниченной ответственностью «Гротекс» Санкт-Петербург