МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-005550-220719
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КСИЛОНГ
спрей назальный дозированный, 0,1 мг + 5 мг/доза

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 22 07 19 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, гипертериоз, глаукома, атрофический ринит, сухой ринит, порфирия, гиперплазия предстательной железы, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), одновременное применение с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) и трициклическими антидепрессантами, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 6 лет.	**Противопоказания** Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, гипертиреоз, глаукома, атрофический ринит, сухой ринит, порфирия, гиперплазия предстательной железы, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), одновременное применение с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) и трициклическими антидепрессантами, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 6 лет.
Применение при беременности и период грудного вскармливания Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Представитель
ОАО "Фармстандарт-Лексредства" А.А. Усманова