ЛП-№(012808)-(РГ-RU) от 11.12.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.12.2025 № 30562
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ацилакт, суппозитории вагинальные

Регистрационный номер:

Торговое наименование

Ацилакт

Международное непатентованное или группировочное наименование

Лактобактерии ацидофильные

Лекарственная форма

Суппозитории вагинальные

Состав

Действующее вещество: лактобактерии ацидофильные
Каждый суппозиторий содержит живые лактобактерии ацидофильные не менее 10^7 КОЕ;
Вспомогательные вещества: жир кондитерский растительный (заменитель масла какао) - 0,9 г, парафин нефтяной твердый - 0,1 г, эмульгатор Т-2 - 0,1 г.

Описание

Суппозитории желтовато-серого или разных оттенков бежевого цвета, конусообразной, торпедообразной или цилиндрической формы; допускается специфический запах жира и неоднородность цвета в виде вкраплений или «мраморности», возможно окрашивание кончика суппозитория от бледно-желтого до светло-коричневого цвета.

Характеристика препарата

Препарат представляет собой микробную массу живых лактобактерий ацидофильных, антагонистически активных штаммов *Lactobacillus acidophilus 100аш, NK_1, $K_3Ш_{24}$*, лиофилизированную с добавлением защитной сахарозо-желатино-молочной среды и сформированную в медицинские суппозитории.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии; противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами; другие противомикробные средства и антисептики.

Код АТХ: G01AX14

Фармакологические свойства

Фармакодинамические эффекты

Ацилакт обладает высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микробов, включая стафилококки, энтеропатогенные кишечные палочки, протеи, что определяет корригирующее действие препарата при нарушениях бактериоценоза женских гениталий.

Фармакокинетические свойства

Компоненты препарата не оказывают системного действия.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.12.2025 № 30562
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Показания к применению

Препарат Ацилакт показан к применению у взрослых при вагинальных дисбиозах и неспецифических воспалительных процессов влагалища:

- неспецифические кольпиты. Назначают как самостоятельное средство или после окончания курса антибактериальной терапии;
- дисбиозы влагалища, в том числе бактериальный вагиноз. Назначают как самостоятельное средство или в комплексной терапии;
- подострые и хронические стадии воспалительных процессов женской половой сферы. Назначают после окончания курса антибактериальной терапии с целью реабилитации;
- гормонально зависимые кольпиты, сенильные и др. Назначают как самостоятельное средство или на фоне специфической гормональной терапии;
- подготовка к плановым гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений;
- предродовая подготовка беременных группы риска по развитию воспалительных заболеваний с целью профилактики и лечения дисбиоза влагалища;
- в качестве вспомогательного средства в сочетании и после специфической антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии при лечении урогенитальных инфекций и заболеваний, передающихся половым путем (гонореи, урогенитального хламидиоза, урогенитального герпеса и др.);

Рекомендуется сочетанное применение суппозиториев и одной из пероральных форм Ацилакта.

Противопоказания

Гиперчувствительность к лактобактериям ацидофильным или к любому из вспомогательных веществ.
Не рекомендуется применять при симптомах вульвовагинального кандидоза (молочницы).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат разрешен для применения женщинам в период беременности и грудного вскармливания. Особых условий приема нет.

Способ применения и дозы

Перед интравагинальным введением с суппозитория удаляют упаковочный материал.

При лечении сенильных вагинитов гормональной природы и дисбиозов влагалища препарат применяют по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 5-10 дней.
При нарушении чистоты вагинального секрета у беременных до III-IV степени препарат применяют по 1 суппозиторию1-2 раза в сутки в течение 5-10 и более дней под контролем восстановления чистоты вагинального секрета до I-II степени и исчезновения клинических симптомов.
С целью профилактики гнойно-септических осложнений применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней до предполагаемой операции или родоразрешения.
С целью восстановительной терапии после применения антибиотиков применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 10 дней. Курс повторяют по назначению врача через 10-20 дней.

Применение у детей

Безопасность и эффективность препарата Ацилакт, суппозитории вагинальные, у детей в возрасте от 0 до 17 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Побочное действие

Побочные действия препарата не установлены. При появлении побочных действий, не упомянутых в инструкции, необходимо обратится к лечащему врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.12.2025 № 30562
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Передозировка

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение Ацилакт суппозиториев возможно сочетать с одновременным назначением антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии. Не рекомендуется одновременное вагинальное применение антибактериальных препаратов с Ацилакт суппозиториями.

Особые указания

Препарат не пригоден для применения:
- с истекшим сроком годности;
- без маркировки;
- целостность упаковки которого нарушена;
- с измененными физическими свойствами (изменение цвета, появление запаха прогорклого жира, деформация суппозитория).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат Ацилакт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные. По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной белого цвета. По 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона с инструкцией по применению.

Условия хранения

При температуре от 2 до 8 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия транспортирования

При температуре от 2 до 8 ºС.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/адрес места производства

АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА», Россия
Ярославская обл., городской округ г. Переславль-Залесский, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38;
Ярославская обл., городской округ г. Переславль-Залесский, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38, стр. 3.

Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителя

АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА», Россия, 127015, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Беговой, проезд Бумажный, д. 14, стр. 1, этаж 6, ком. 7, тел. +7(499) 257-10-90.