ЛП-№(011659)-(РГ-RU) от 12.09.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2025 № 22718
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ацилакт

Регистрационный номер

Торговое наименование

Ацилакт

Международное непатентованное или группировочное наименование

Лактобактерии ацидофильные

Лекарственная форма

таблетки

Состав

Действующее вещество: живые лактобактерии ацидофильные.

Каждая таблетка (1 доза) содержит живые лактобактерии ацидофильные не менее 10^7 КОЕ;

Каждая таблетка (5 доз) содержит живые лактобактерии ацидофильные не менее 5×10^7 КОЕ.

Вспомогательные вещества:

Каждая таблетка (1 доза) содержит лактоза – 200 мг, кальция стеарат – 7 мг, тальк – 7 мг.

Каждая таблетка (5 доз) содержит лактоза – 135 мг, кальция стеарат – 7 мг, тальк – 7 мг.

Описание

Таблетки желтовато-серого или разных оттенков бежевого цвета, допускается «мраморность» окраски, имеют круглую форму с плоскими или слегка выпуклыми гладкими поверхностями, со специфическим запахом.

Характеристика препарата

Препарат представляет собой микробную массу живых лактобактерий ацидофильных, антагонистически активных штаммов *Lactobacillus acidophilus 100аш, NK_1, $К_3Ш_{24}$*, лиофилизированную с добавлением защитной сахарозо-желатино-молочной среды и спрессованную в таблетку.

Фармакотерапевтическая группа

Фармакотерапевтическая группа: противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства; противодиарейные микроорганизмы.

Код АТХ: A07FA01

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2025 № 22718
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат обладает высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, включая стафилококки, шигеллы, энтеропатогенные кишечные палочки, протей, что определяет корригирующее действие препарата при нарушениях бактериоценоза ротовой полости и кишечника.

Фармакокинетика

Компоненты препарата не всасываются из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и не оказывают системного действия.

Показания к применению

Препарат Ацилакт показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 3 лет при лечении заболеваний полости рта и желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся нарушениями нормальной микрофлоры.

При заболеваниях полости рта:

- воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта (глоссит, афтозный стоматит, язвенно-некротический гингивит);
- патологические изменения слизистой полости рта, сопровождающие системные заболевания (красный плоский лишай, мультиформная экссудативная эритема, болезнь Шэгрена);
- другие заболевания полости рта, связанные с дисбактериозом (гальванизм, множественные поражения зубов кариесом, пародонтит), подготовка к плановым челюстно-лицевым операциям с целью профилактики гнойно-воспалительных осложнений.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта:

- острые кишечные инфекции, пищевые токсикоинфекции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами или неустановленной этиологии; ротавирусный гастроэнтерит;
- длительные кишечные расстройства, особенно у детей раннего возраста;
- затяжные и хронические колиты и энтероколиты инфекционной и неинфекционной этиологии, сопровождающиеся нарушением микрофлоры;
- среднетяжелая и легкая форма неспецифического язвенного колита у взрослых;
- ослабленные, часто болеющие дети и взрослые с явлениями дисбактериоза, в том числе сопровождающегося иммунодефицитным состоянием;
- комплексная терапия атопического дерматита у детей с явлениями дисбактериоза кишечника.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2025 № 22718
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Корригирующую терапию ацилактом можно назначить после курса лечения бактериофагами.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы. Возраст до 3х лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат разрешен для применения женщинам в период беременности и грудного вскармливания. Особых условий приема нет.

Способ применения и дозы

Суточную дозу и продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от клинической формы заболевания и выраженности дисбактериоза.

При заболеваниях полости рта:

При заболеваниях слизистой оболочки препарат применяют после еды, рассасывая таблетку.

При глоссите назначают 5 доз 2-3 раза в сутки, курс лечения составляет 14-15 дней. При рецидивирующем афтозном стоматите и язвенно-некротическом гингивите лечение проводят по такой же схеме двумя курсами с перерывом в 7 дней.

При патологических процессах в полости рта, обусловленных системными заболеваниями, назначают по 10 доз 4 раза в сутки двумя курсами по 14-15 дней каждый с перерывом в 7 дней.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта:

Таблетированный препарат принимают внутрь не позднее, чем за 20-30 мин до еды, запивая водой.

Больным с кишечными расстройствами назначают по 5 доз 2-3 раза в сутки.

При острых воспалительных процессах кишечника курс лечения составляет 7-8 дней, при затяжных и рецидивирующих формах заболевания – 14-21 день.

При необходимости врач назначает повторные курсы под контролем лабораторных показателей.

При нарушениях нормальной микрофлоры кишечника у детей с атопическим дерматитом по 5 доз в сутки курсами 20 - 25 дней, с перерывами в 1,5 - 2 мес. Количество курсов определяется состоянием кожного покрова и нормализацией микрофлоры кишечника.

Применение у детей

Режим дозирования для детей от 3 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Препарат Ацилакт, таблетки не рекомендуется для применения у детей до 3 лет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2025 № 22718
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Побочное действие

Побочные действия препарата не установлены. При появлении побочных действий, не упомянутых в инструкции, необходимо обратится к лечащему врачу.

Передозировка

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение таблеток возможно сочетать с одновременным проведением антибактериальной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии.

Особые указания

Препарат не пригоден для применения:

- с истекшим сроком годности;
- без маркировки;
- целостность упаковки которого нарушена;
- с деформированными таблетками в банке.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Таблетки, 1доза, 5 доз.

По 20, 30, 60 таблеток в банке пропиленовой с крышкой из пропилена с контролем первого вскрытия. 1 банка в пачке из картона с инструкцией по применению.

Условия хранения

Хранить в холодильнике (2-8 °С). Хранить в недоступном для детей месте.

Условия транспортирования

Транспортировать в холодильнике (2-8 °С).

Срок годности

18 мес.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА», Россия

Ярославская обл., городской округ г. Переславль-Залесский, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38;

Ярославская обл., городской округ г. Переславль-Залесский, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38, стр. 3.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.09.2025 № 22718
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителя

АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА», Россия, 127015, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Беговой, проезд Бумажный, д. 14, стр. 1, этаж 6, ком. 7, тел. +7(499) 257-10-90.