

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ОКОВИДИТ®

Внимательно прочитайте инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред, даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Регистрационный номер**Торговое название препарата:** ОКОВИДИТ®**Группировочное наименование:** Ламинарии слоевищ экстракт**Лекарственная форма:** гель для наружного применения**Состав на 1 г геля:**

Действующее вещество: ламинарии экстракт сухой 10 мг

Вспомогательные вещества: макрогол 400, макрогол 1500

Описание: гель полупрозрачный, с сероватым оттенком, со слабым характерным запахом**Фармакотерапевтическая группа:** кератопротекторное средство**Код АТХ:** S01AD05**Фармакологическое действие:**Фармакодинамика

ОКОВИДИТ® - экстракт морской водоросли ламинарии содержит комплекс аминокислот, макро- и микроэлементы, витамины, органически связанный йод. Способствует улучшению обмена веществ и кровообращения в тканях глаза, обладает репаративным и рассасывающим действием, способствует

рассасыванию помутнений и более быстрому заживлению повреждений различного происхождения, уменьшению дистрофических явлений, зрительного утомления и улучшению зрительных функций.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

- дистрофические заболевания переднего отдела глаза (дистрофии роговицы, конъюнктивы);
- послеоперационный болевой синдром;
- ускорение процессов регенерации роговицы после операций и травм;
- помутнения роговицы различного происхождения (последствия вирусных кератитов, бактериальных язв, травм и ожогов глаза);
- повреждение роговицы при использовании контактных линз;
- центральная хореоретинальная дистрофия сетчатки (сухая форма).

Противопоказания

- повышенная чувствительность к ламинарии и другим компонентам препарата;
- дерматиты кожи век;
- острые аденовирусные и бактериальные конъюнктивиты;
- аллергическая реакция на препараты йода;
- выворот век.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка.

Перед применением препарата ОКОВИДИТ[®], если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

В период грудного вскармливания перед применением препарата ОКОВИДИТ[®] необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Препарат в количестве полоски геля 7-8 мм наносят на кожу нижнего или верхнего века, либо после нанесения геля на тканевую основу лейкопластыря, который приклеивают на середину нижнего века, отступив на 2 мм от ресничного края ежедневно на 1-3 часа. Допускается продолжительность воздействия препарата до 8-10 часов. Курс лечения составляет 10 дней. При необходимости лечение может быть продлено до 30 дней. Проведение повторных курсов возможно после консультации офтальмолога.

Если через 10 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

- аллергические реакции,
- раздражение кожи век в месте нанесения препарата.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании показано промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Особые указания

При применении препарата исключить использование косметических средств.

Применять только для наружного нанесения на кожу век.

Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Гель для наружного применения 1% по 5 г, 10 г в тубах алюминиевых с бушонами. Одну тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную. Лейкопластырь в пачке не предусмотрен.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Замораживание не допускается.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец РУ: ООО «ДИОПТРА», Россия

Адрес производственной площадки: ЗАО «Фирн М», 108804, г. Москва, п. Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4

Адрес для направления претензий: ЗАО «Фирн М», 108804, г. Москва, п. Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4

Тел. (495) 956-15-43

/ Генеральный директор

ООО «ДИОПТРА»



Э.М.Миронова