

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЛАНДЫША НАСТОЙКА

Регистрационный номер

Торговое наименование

Ландыша настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование

Ландыша травы настойка

Лекарственная форма

Настойка

Состав:

Для получения настойки используют:

Ландыша травы

- 100 г

Этанола (спирта этилового) 70 %

- достаточное количество для получения 1000 мл

Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета, со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения заболеваний сердца; сердечные гликозиды; другие сердечные гликозиды.

Код АТХ C01AX

Фармакологическое действие

Основными действующими веществами ландыша настойки являются гликозиды (конваллятоксин, конваллозид, конваллотоксол). Оказывает кардиотоническое действие.

Показания к применению

Препарат Ландыша настойка показан к применению у взрослых при нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу, в составе комплексной терапии при хронической сердечной недостаточности I-II функционального класса.

Противопоказания

- гиперчувствительность к ландыша траве или к любому из вспомогательных веществ.
- кардиосклероз.
- инфаркт миокарда.
- стенокардия.
- желудочковая тахикардия.
- эндокардит.
- миокардит.
- АВ блокада II-III ст.
- детский возраст до 18 лет.
- беременность.
- период грудного вскармливания.

С осторожностью

Алкоголизм, заболевания печени и/или почек, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 15-20 капель 2-3 раза в день после еды. Длительность лечения определяется врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, аритмия, мышечная слабость, головная боль.

Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение – симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат усиливает действие снотворных и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Ландыша настойка проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

В максимальной суточной дозе препарата содержится 1,6 г абсолютного этилового спирта; в максимальной разовой дозе препарата содержится 0,53 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Настойка. По 25 мл во флаконы/флаконы-капельницы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками/пробками-капельницами из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления.

Каждый флакон/флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке) для защиты от света.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «ДАНСОН-РУ»

Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, стр.49, пом.1,
ком.220

Тел.: +7 (495) 580-30-60

Производитель/Организация принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»,

Российская Федерация, 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5

Тел.: (4852) 44-38-56

e-mail: farmfab@yaroslavl.ru