ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению

ПРЕПАРАТА
Соматулин®

Регистрационный номер: П № 010212/01

Изменение № 2

Срок введения изменений с "25" 03 2009 г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению - акромегалия; - карциноидные опухоли (симптоматическая терапия).	**Показания к применению** - акромегалия; - карциноидные опухоли (симптоматическая терапия); - лечение фистулы органов пищеварительного тракта, возникшей в результате хирургического вмешательства.
Способ применения и дозы Препарат вводится только внутримышечно (в/м) в специализированных учреждениях и в точном соответствии с данной инструкцией. Лечение начинают с пробного введения (в случае ее неэффективности дальнейшая терапия нецелесообразна) и оценивают ответную реакцию (динамику секреции роста гормона роста, симптомов, связанных с карциноидной опухолью). Режим дозирования и длительность терапии устанавливают индивидуально для каждого пациента. Начинают 30 мг препарата в/м 1 раз в 14 дней. При недостаточной эффективности можно увеличить частоту введения препарата до 1 инъекции каждые 10 дней.	**Способ применения и дозы** Препарат вводится только внутримышечно (в/м) в специализированных учреждениях и в точном соответствии с данной инструкцией. Лечение начинают с пробного введения (в случае ее неэффективности дальнейшая терапия нецелесообразна) и оценивают ответную реакцию (динамику секреции роста гормона роста, симптомов, связанных с карциноидной опухолью). Режим дозирования и длительность терапии устанавливают индивидуально для каждого пациента. Начинают 30 мг препарата в/м 1 раз в 14 дней. При недостаточной эффективности можно увеличить частоту введения препарата до 1 инъекции каждые 10 дней. <u>Лечение фистулы органов пищеварительного тракта</u> Лечение начинают с пробной внутримышечной инъекции для оценки ответной реакции. В случае уменьшения объема выделения из фистулы более чем на 50% в течение 72 часов после инъекции, препарат применяется 1 раз в десять дней, вплоть до заживления фистулы. Максимальное количество дополнительных

Старая редакция	Новая редакция
	инъекций – 3. У 50% пациентов полное закрытие фистул наблюдается уже через 14 дней.

Менеджер по регистрации _____ Добролюбова Г.В.
подпись

«21» 07 2008 г.

М.П.

И.о. Директора ИДКЭЛС _____ Васильев А.Н.
подпись

«___»_____ 2008 г.