ЛП-№(007318)-(РГ-RU) от 21.10.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.10.2024 № 22653
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФИТОДИАРИН®

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Фитодиарин®.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Лапчатки прямостоячей корневища +Мать-и-мачехи обыкновенной листья+ Подорожника большого листья +Тысячелистника обыкновенного трава + Шалфея лекарственного листья.

Лекарственная форма.

Сбор-порошок.

Состав.

Лапчатки прямостоячей корневища	37,5 %
Подорожника большого листья	25,0 %
Мать-и-мачехи обыкновенной листья	12,5 %
Тысячелистника обыкновенного трава	12,5 %
Шалфея лекарственного листья	12,5 %

Описание.

Смесь частиц растительного сырья серовато-зеленого цвета с беловатыми, желтоватыми, светло-коричневыми, красно-коричневыми и темно-коричневыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-вяжущий с ощущением слизистости.

Фармакотерапевтическая группа.

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие.

Настой сбора оказывает антимикробное (обладает бактериостатической активностью в отношении грамположительных бактерий рода Staphylococcus, грамотрицательных бактерий родов Escherichia, Proteus, Pseudomonas; фунгистатической активностью в отношении мицелиальных грибов рода Microsporum и рода Trichophyton), вяжущее, противовоспалительное действие.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.10.2024 № 22653
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Показания к применению.

В составе комплексной терапии острых и хронических кишечных инфекций, сопровождающихся диареей, дисбактериоза кишечника, воспалительных заболеваний кожи (пиодермия), полости рта (гингивит, стоматит), глотки (острый тонзиллит).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции печени, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 30 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

В терапии острых и хронических кишечных инфекций, дисбактериоза кишечника принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя 3 раза в день за 30 мин до еды или через 1 час после еды. Курс лечения 3-4 недели.

При воспалительных заболеваниях полости рта и глотки применяют местно для полосканий по 1/2 стакана теплого настоя 3-4 раза в день.

При воспалительных заболеваниях кожи настой применяют наружно в виде примочек.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.10.2024 № 22653
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Передозировка.

При применении препарата с превышением рекомендуемых доз и рекомендуемого курса лечения возможно развитие раздражающего действия на желудочно- кишечный тракт и печень.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 2 недель следует сообщить об этом врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т. ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Сбор-порошок. По 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°С.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.10.2024 № 22653
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,
телефон +7 (495) 566-00-14, E-mail: sales@lektrava.ru