

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ментоловое масло

Регистрационный номер:**Торговое наименование**

Ментоловое масло

Международное непатентованное или группировочное наименование

Левоментол

Лекарственная форма

Раствор для местного применения и ингаляций [масляный]

Состав на 100 г:

	1 %	2 %
<i>Активное вещество:</i> левоментол	-1,0 г	2,0 г
<i>Вспомогательное вещество:</i> парафин жидкий	- 99,0 г	98,0 г.

Описание

Бесцветная маслянистая жидкость со слабым запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.

Код АТХ: R07AX**Фармакологическое действие**

Препарат обладает антисептическим и противовоспалительным действием. При нанесении на кожные покровы левоментол оказывает местнораздражающее действие, сопровождающееся уменьшением выраженности болевого синдрома и зуда. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует устранению болевых ощущений. Местное действие сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, переходящим в ощущение легкого жжения и покалывания. Кожно-висцеральные эффекты (рефлекторная

дуга не затрагивает головной мозг) улучшают трофику тканей (соответственно зонам иннервации).

Показания к применению

В составе комплексной терапии в качестве симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, трахеит); для облегчения носового дыхания.

Противопоказания

Гиперчувствительность к левоментолу или к любому из вспомогательных веществ, детский возраст до 3-х лет, бронхиальная астма, склонность к бронхоспазму, ларингоспазму, коклюш.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с недостаточностью клинических данных).

Способ применения и дозы

Местно. Ингаляционно. Взрослым и детям старше 3-х лет при заболеваниях дыхательных путей: по 15-20 капель препарата разводят в стакане (200 мл) воды и используют для проведения паровых ингаляций в течение 5-10 минут 1-2 раза в день. Курс лечения 7-10 дней.

При рините – по 5-10 капель в каждый носовой ход 2-3 раза в день. Перед применением препарата рекомендуется освободить носовой ход от секрета.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, контактный дерматит, бронхоспазм, ларингоспазм, появление жжения, чихания или усиление заложенности носа; при интраназальной аппликации у детей – рефлекторное угнетение дыхания (вплоть до апноэ) и коллапс. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются,

или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. При случайном попадании препарата в глаза рекомендуется обильно промыть их водой. Необходимо проинформировать пациента о том, что: препарат следует принимать только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции; если через 7 дней лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. При необходимости применения более 3-х дней необходима консультация с врачом. Частое и длительное применение препарата может привести к усилению заложенности носа. В компрессионных и УЗ-ингаляторах не применяется.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Раствор для местного применения и ингаляций [масляный] 1 %, 2 %.

По 10 мл или 25 мл препарата во флаконы оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками.

По 10 мл или 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками-капельницами и навинчиваемыми крышками.

Каждый флакон или флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Допускается упаковка флаконов или флаконов-капельниц с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73.