ЛП-№(008348)-(РГ-RU) от 28.12.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2024 № 28851
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭВАМЕНОЛ® НАЗО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ЭВАМЕНОЛ® НАЗО

Международное непатентованное или группировочное наименование: Левоментол + Фенилсалицилат

Лекарственная форма: капли назальные

Состав на 100 г

Действующие вещества:

Левоментол - 1 г

Фенилсалицилат - 3 г

Вспомогательное вещество:

Парафин жидкий (вазелиновое масло) - 96 г

Описание: бесцветная маслянистая жидкость с запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство.

Код АТХ: M02AX10

Фармакологическое действие

Антисептическое комбинированное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

При нанесении на кожные покровы ментол оказывает местнораздражающее, некоторое противомикробное и противовоспалительное действие, сопровождающееся уменьшением выраженности болевого синдрома и зуда. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует устранению болевых ощущений. Местное действие сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, переходящим в ощущение легкого жжения и покалывания. Кожно-висцеральные эффекты (рефлекторная дуга не затрагивает головной мозг) улучшают трофику тканей (соответственно зонам иннервации).

Фенилсалицилат – фениловый эфир салициловой кислоты, распадается на салициловую кислоту и фенол, которые оказывают слабое противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2024 № 28851
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, трахеит). Препарат применяется для симптоматического лечения в комплексной терапии для облегчения носового дыхания.

Противопоказания

Гиперчувствительность к левоментолу, фенилсалицилату или к любым компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 6 лет, бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с недостаточностью клинических данных).

Способ применения и дозы

Интраназально. Взрослым и детям с 6-ти лет по 2 капли в каждый носовой ход или в виде смазывания слизистой оболочки носовых ходов ватной палочкой, смоченной препаратом, 2-3 раза в день. При сохранении симптомов более 3-х дней необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Аллергические реакции, контактный дерматит, бронхоспазм, появление жжения, чихания или усиление заложенности носа.

Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

Возможная передозировка может привести к дискомфорту со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноте.

Лечение: симптоматическое под контролем врача.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2024 № 28851
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В настоящее время данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. При случайном попадании препарата в глаза рекомендуется обильно промыть водой. При ухудшении состояния или сохранении симптомов более 3-х дней, необходимо проконсультироваться с врачом. Не применять более 3-х дней, при необходимости применения более 3-х дней необходима консультация с врачом. Частое и длительное применение препарата может привести к усилению заложенности носа.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Капли назальные, 1 % + 3 %.

По 8 мл, 12 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные крышками пластмассовыми с пипетками.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 ^{0}С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2024 № 28851
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Россия, 125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д. 1

тел. +7 (495) 956-05-71

www.mosfarma.ru