ЛП-№(010005)-(РГ-RU) от 29.04.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.04.2025 № 11107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭВАМЕНОЛ® НАЗО

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: ЭВАМЕНОЛ® НАЗО

Международное непатентованное или группировочное наименование: Левоментол + Фенилсалицилат

Лекарственная форма: спрей назальный

Состав на 100 г

Действующие вещества:

Левоментол - 1 г

Фенилсалицилат - 3 г

Вспомогательное вещество:

Парафин жидкий (вазелиновое масло) - 96 г

Описание: прозрачная бесцветная маслянистая жидкость с запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний носа; деконгестанты и другие препараты для местного применения; другие препараты для лечения заболеваний носа.

Код АТХ: R01AX30.

Фармакологическое действие

Антисептическое комбинированное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

При нанесении на кожные покровы ментол оказывает местнораздражающее, некоторое противомикробное и противовоспалительное действие, сопровождающееся уменьшением выраженности болевого синдрома и зуда. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует устранению болевых ощущений. Местное действие сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, переходящим в ощущение легкого жжения и покалывания. Кожно-висцеральные эффекты (рефлекторная дуга не затрагивает головной мозг) улучшают трофику тканей (соответственно зонам иннервации).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.04.2025 № 11107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Фенилсалицилат – фениловый эфир салициловой кислоты, распадается на салициловую кислоту и фенол, которые оказывают слабое противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

Показания к применению

Препарат ЭВАМЕНОЛ® НАЗО показан к применению у взрослых и детей от 6 до 18 лет:

- при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, трахеит);
- для симптоматического лечения в комплексной терапии для облегчения носового дыхания.

Противопоказания

Гиперчувствительность к левоментолу, фенилсалицилату или любому из вспомогательных веществ, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 6 лет, бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с недостаточностью клинических данных).

Способ применения и дозы

Местно (интраназально).

Взрослые

По 1 впрыскиванию в каждый носовой проход 2–3 раза в день.

Дети

Режим дозирования для детей от 6 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Не применять препарат детям до 6 лет, в связи с отсутствием данных по клиническому применению препарата у детей данного возраста.

Перед применением препарата рекомендуется освободить носовой ход от секрета, а во время его введения необходимо сделать легкий вдох через нос.

Перед первым применением назального спрея необходимо произвести его «калибровку» путем нажатия на головку распылителя несколько раз.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.04.2025 № 11107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Побочное действие

Аллергические реакции, контактный дерматит, бронхоспазм, появление жжения, чихания или усиление заложенности носа.

При появлении нежелательных явлений или других необычных реакций, не описанных в инструкции, необходимо обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

Возможная передозировка может привести к дискомфорту со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноте.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

В настоящее время данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. При случайном попадании препарата в глаза рекомендуется обильно промыть водой. При ухудшении состояния или сохранении симптомов более 5-10 дней необходимо пересмотреть назначенное лечение. Не применять более 3-х дней. Частое и длительное применение препарата может привести к усилению заложенности носа.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Спрей назальный, 1 % + 3 %.

По 8 мл, 12 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные крышками со спрей-насадками.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

4 года.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.04.2025 № 11107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 ^{0}C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

Россия, 125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д. 1

тел. +7 (495) 956-05-71

www.mosfarma.ru