ЛП-№(009413)-(РГ-RU) от 25.03.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.03.2025 № 7605
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Эваменол®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Эваменол®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Левоментол + Эвкалипта шарикового листьев масло

Лекарственная форма: мазь назальная

Состав на 100 г

Действующие вещества:

Левоментол	- 1 г
Эвкалипта шарикового листьев масло (Эвкалиптовое масло)	- 1 г

Вспомогательное вещество:

Вазелин	- до 100 г

Описание: мазь от светло-желтого до желтого цвета с характерным запахом ментола и масла эвкалиптового.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний носа; деконгестанты и другие препараты для местного применения; другие препараты для лечения заболеваний носа.

Код АТХ: R01AX

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат. Обладает местнораздражающим («отвлекающим»), противовоспалительным, некоторым антисептическим действием, способствует сужению кровеносных сосудов слизистой оболочки носовых ходов.

Фармакологический эффект препарата обусловлен свойствами входящих в его состав компонентов.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.03.2025 № 7605
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Ментол – местнораздражающее средство, эффект которого обусловлен рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных рецепторов слизистых оболочек. Оказывает легкое местноанестезирующее («отвлекающее») действие, обладает слабыми антисептическими свойствами.

Эвкалиптовое масло оказывает стимулирующее действие на рецепторы слизистых оболочек и оказывает противовоспалительное и антисептическое действие.

Показания к применению

Препарат показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 2 лет до 18 лет в качестве симптоматического средства в комплексной терапии при лечении острого и хронического ринита.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ; склонность к ларинго- и бронхоспазму; бронхиальная астма; коклюш; ложный круп (острый стенозирующий ларинготрахеит); кашель, вызванный скоплением мокроты (слизи), продолжительный или хронический кашель, вызванный курением или эмфиземой; аллергический ринит; детский возраст до 2 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с отсутствием специальных исследований у данной группы пациентов).

Способ применения и дозы

Интраназально.

У взрослых препарат наносят в количестве приблизительно 0,5 см в каждый носовой ход на поверхность слизистой оболочки передних отделов носовой полости. Для введения можно использовать ватный тампон или ватную палочку. Затем умеренным надавливанием на крылья носа растирают мазь по слизистой носа. Процедуру повторяют 2–3 раза в день. Курс лечения составляет 5–10 дней. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача.

Дети

Режим дозирования у детей в возрасте от 2 до 18 лет не отличается от режима дозирования у взрослых. Безопасность и эффективность у детей в возрасте от 0 до 2 лет на настоящий момент не установлены. Данные отсутствуют.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.03.2025 № 7605
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, зуд, жжение, покраснение или отек слизистой оболочки носовой полости, слезотечение.

Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу!

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано.

Особые указания

Не проглатывать. Следует избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. При случайном попадании мази в глаза рекомендуется обильно промыть водой. При ухудшении состояния или сохранении симптомов более 5–10 дней, необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Мазь назальная, 1 % + 1 %. По 15 г в тубы алюминиевые или по 20 г в банки темного стекла с треугольным венчиком, укупоренные крышками полимерными натягиваемыми из полиэтилена высокого давления или из смеси полиэтиленов высокого и низкого давления.

Каждую тубу или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.03.2025 № 7605
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

Россия, 125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д. 1

тел. +7(495) 956-05-71

www.mosfarma.ru