МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

# КОРМЕНТОЛ

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Корментол

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** левоментола раствор в ментил изовалерате

**Лекарственная форма:** капсулы подъязычные

**Состав на одну капсулу:**

*Действующее вещество*: левоментола раствор в ментил изовалерате - 100,00 мг;

*Вспомогательные вещества:* альфа-токоферола ацетат (витамин Е) - 0,45 мг, масло оливковое рафинированное - q. s. до 160,00 мг;

*Желатиновая оболочка капсулы*: желатин – 72,0000 мг, вода очищенная – 56,2384* мг, глицерол – 31,5216 мг, метилпарагидроксибензоат (Е 218) – 0,2400 мг.

*Указано закладываемое количество воды очищенной. Вода частично испаряется в процессе производства и ее содержание в готовом продукте меньше закладываемого.

**Описание**

Капсулы мягкие, желатиновые, овальной формы, от светло-желтого до светлого коричневато-желтого цвета. Содержимое капсул - прозрачная бесцветная или с желтоватым оттенком маслянистая жидкость с запахом ментола.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Коронародилатирующее средство рефлекторного действия.

**Код АТХ:** C01EX.

**Фармакологические свойства**

***Фармакодинамика***

Препарат оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний. Стимулирует выработку и высвобождение энкефалинов, эндорфинов и ряда других пептидов, гистамина, кининов, которые принимают активное участие в регуляции проницаемости сосудов и формировании болевых ощущений.

126924

При сублингвальном приеме терапевтический эффект наступает в среднем через 5 мин, при этом до 70% препарата высвобождается в течение 3 мин.

***Фармакокинетика***

При сублингвальном (под язык) применении левоментол абсорбируется со слизистой оболочки ротовой полости. После всасывания препарат метаболизируется в печени и выводится почками в виде глюкуронидов.

**Показания к применению**

Функциональные кардиалгии, неврозы, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, тяжелая артериальная гипотензия, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

**Способ применения и дозы**

Корментол назначают взрослым под язык, по 1 капсуле 2-3 раза в день. Капсулу следует держать под языком до ее полного рассасывания. Суточная кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При недостаточно выраженном терапевтическом эффекте или, когда у отдельных пациентов в ближайшие 5 минут после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратиться к врачу.

**Побочное действие**

Тошнота, чувство дискомфорта в животе, слезотечение, головокружение, также возможны кратковременное снижение артериального давления, сонливость. Описанные явления, как правило, кратковременны, проходят самостоятельно и не требуют отмены препарата.

В редких случаях возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, кожный зуд, ангионевротический отек). В связи с наличием в составе метилпарагидроксибензоата, препарат может вызывать аллергические реакции замедленного типа (например,

126924

контактный дерматит) или (реже) реакции немедленного типа (крапивница, бронхоспазм).

***Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.***

**Передозировка**

*Симптомы*: тошнота, головная боль, резкое снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы, нарушение сердечной деятельности, повышенная возбудимость.

*Лечение*: отмена препарата, симптоматическая терапия.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При одновременном применении может усиливать действие гипотензивных препаратов, седативный эффект психотропных средств, опиоидных анальгетиков, средств для общей и местной анестезии, этанола.

Одновременный прием с нитратами способствует уменьшению головной боли, возникающей при их применении.

**Особые указания**

Не рекомендуется одновременный прием алкоголя.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

В связи с возможными побочными эффектами (головокружение, сонливость) в период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, работе с механизмами или занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска**

Капсулы подъязычные 100 мг.

По 15 капсул в блистер из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1 блистеру вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.



126924

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять после окончания срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение**

ЗАО «Гидимас», Литовская Республика, ул. Мейстру, 9, Вильнюс, Вильнюсское городское самоуправление.

**Производитель**

К.О. Биофарм С.А., Румыния, г. Бухарест, ул. Логофэтул Тэуту № 99, сектор 3.

**Адрес производственной площадки**

К.О. Биофарм С.А., Румыния, г. Бухарест, ул. Логофэтул Тэуту № 99, сектор 3

**Организация, принимающая претензии**

Общество с ограниченной ответственностью «Биосайнс СиАйС» (ООО «Биосайнс СиАйС») 107370, г. Москва, ул. Тюменская, д.5, стр.15

Тел.: +7 (495) 410-5791

Факс: +7(495) 942-5233

МЗ РФ ФГБУ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ЦЭСМП

Генеральный директор
ООО «Биосайнс СиАйС» А.В. Анисимова

Общество с ограниченной ответственностью "Биосайнс СиАйС" 1147746555371 * МОСКВА *

126924