ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ВАЛИДОЛ С ГЛЮКОЗОЙ

Регистрационный номер

Торговое название препарата: Валидол с глюкозой

Международное непатентованное название или группировочное название: левоментола раствор в ментил изовалерате + [декстроза]

Лекарственная форма: таблетки подъязычные

Состав (на одну таблетку)
Действующих веществ:
Левоментола раствор в ментил изовалерате (Валидола) – 60 мг,
Декстрозы моногидрата (глюкозы моногидрата) – 188 мг
Вспомогательных веществ: сахар (сахароза), аэросил (кремния диоксид коллоидный), стеариновая кислота – достаточное количество до получения таблетки массой 800 мг.

Описание
Таблетки плоскоцилиндрической формы, белого или белого с сероватыми вкраплениями цвета, с риской и фаской, с характерным запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа
Коронародилатирующее средство рефлекторного действия.

Код АТХ C01EX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика
Оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний. Стимулирует выработку и освобождение энкефалинов, эндорфинов и ряда других пептидов, кининов (за счет раздражения рецепторов слизистой оболочки), которые принимают активное участие в регуляции проницаемости сосудов, формировании болевых ощущений. При сублингвальном приеме терапевтический эффект, в среднем, наступает через 5 мин, при этом до 70 % препарата высвобождается в течение 3 мин.
Декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат) участвует в различных процессах обмена веществ в организме, участвует в метаболических процессах.

Фармакокинетика.
При сублингвальном применении абсорбируется со слизистой оболочки полости рта. После всасывания биотрансформируется в печени и выводится почками в виде глюкуронидов.
Декстрозы моногидрат полностью усваивается организмом, почками не выводится (появление в моче является патологическим признаком).

Показания к применению
Функциональные кардиалгии, неврозы, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 3-х лет.

С осторожностью
Назначать больным сахарным диабетом (препарат содержат сахар).

Способ применения и дозы
Валидол назначают взрослым под язык. Таблетку следует держать во рту под языком до полного рассасывания. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день.
Суточная кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При недостаточно выраженном эффекте или, когда у отдельных больных в ближайшие 5 мин. после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратиться к врачу для исключения сердечного приступа или назначения другой терапии. При сильных и усиливающих болях, особенно на фоне предшествующих заболеваний сердца (стенокардия напряжения, перенесенный инфаркт миокарда и другие) необходимо вызвать Скорую помощь.

Побочное действие
При длительном приеме могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение.
Эти явления обычно проходят самостоятельно.

Передозировка
Симптомы: головная боль, тошнота, возбуждение, нарушение деятельности сердца, падение артериального давления, угнетение центральной нервной системы.
Лечение: отменить препарат. Симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
При совместном применении с нейротропными средствами угнетающего типа действия усиливает угнетающее действие последних на центральную нервную систему.
Одновременное применение Валидола с глюкозой с нитратами уменьшает головную боль, которая возникает при их применении.

Особые указания
В 1 таблетке содержится 188 мг декстрозы моногидрата (глюкозы моногидрата), 450 мг сахара (сахарозы), что соответствует 0,054 ХЕ, что следует учитывать больным сахарным диабетом.

Форма выпуска
Таблетки подъязычные.
10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.
1000 контурных ячейковых упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона.

Условия хранения
В сухом месте, при температуре от 12 до 18 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

19024

Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, 172
Тел. (343-55) 3-60-90; факс 3-60-89, 3-60-73.

Генеральный директор
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» Л.А. Солодухина

Российская Федерация * Открытое акционерное общество * Ирбитский химико-фармацевтический завод * Св. № 115/1 серия II-ИИ г. Ирбит Свердловской области

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 00 0 0 0 0 0 0 1
ФГУ НЦЭСМП