МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

МИНЗДРАВ РОССИИ
06 12 22
СОГЛАСОВАНО

МАКЛЕВО®
наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг
лекарственная форма, дозировка

Маклеодз Фармасьютикалз Лтд., Индия
наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения изменения «____» 06 12 22 20____ г

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения МАКЛЕВО® наименование лекарственного препарата	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **МАКЛЕВО®**
Торговое название: МАКЛЕВО®	**Торговое наименование:** МАКЛЕВО®
Международное непатентованное название: левофлоксацин	**Международное непатентованное или группировочное наименование:** левофлоксацин
Состав: В 1 таблетке содержится: *Активное вещество:* Левофлоксацина гемигидрат, эквивалентный левофлоксацину 250,0 мг / 500,0 мг *Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая (66,40 мг / 106,80 мг), крахмал прежелатинизированный (10,00 мг /20,00 мг), полисорбат 80 (2,50 мг /	**Состав:** 1 таблетка содержит: *Действующее вещество:* левофлоксацина гемигидрат эквивалентный левофлоксацину 250,0 мг / 500,0 мг *Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая (66,40 мг / 106,80 мг), крахмал прежелатинизированный (10,00 мг / 20,00 мг), полисорбат 80 (2,50 мг /

Старая редакция	Новая редакция
5,00 мг), кросповидон (5,00 мг/ 10,00 мг), тальк очищенный (1,48 мг / 2,96 мг), кремния диоксид коллоидный (1,50 мг / 2,96 мг), магния стеарат (3,50 мг / 7,00 мг). *состав оболочки:* гипромеллоза (3,83 мг / 5,92 мг), тальк очищенный (0,623 мг /0,963 мг), титана диоксид (0,879 мг / 1,359 мг), краситель железа оксид красный (0,134 мг /0,198 мг), краситель железа оксид желтый (0,036 мг /0,056 мг), пропиленгликоль (2,933 мг /4,533 мг), диэтилфталат (0,365 мг /0,566 мг).	5,00 мг), кросповидон (5,00 мг / 10,00 мг), тальк очищенный (1,48 мг / 2,96 мг), кремния диоксид коллоидный (1,50 мг / 2,96 мг), магния стеарат (3,50 мг / 7,00 мг). *состав оболочки:* гипромеллоза (3,83 мг / 5,92 мг), тальк очищенный (0,623 мг / 0,963 мг), титана диоксид (0,879 мг / 1,359 мг), краситель железа оксид красный (0,134 мг / 0,198 мг), краситель железа оксид желтый (0,036 мг / 0,056 мг), пропиленгликоль (2,933 мг / 4,533 мг), диэтилфталат (0,365 мг / 0,566 мг).
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг и 500 мг. 5 таблеток в блистере (ПВХ/Алюминий). 1, 2, 5 или 10 блистеров с инструкцией по применению помещают в пачку картонную. ***При упаковке на предприятии (АО «Рафарма» или ООО «Эдвансд Фарма», Россия):*** 5 таблеток в блистер (ПВХ/Алюминий), один блистер вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг и 500 мг. 5 таблеток в блистер (ПВХ/Алюминий). 1, 2, 5 или 10 блистеров вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. ***При упаковке на предприятии (ЗАО «Рафарма» или ООО «Эдвансд Фарма», Россия):*** 1 блистер с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. На пачку наносят стикер.
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.	**Условия хранения** В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Условия отпуска из аптек По рецепту.	**Условия отпуска:** отпускают по рецепту.

Представитель
ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ» Волкова Н.В.