ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Полифан®

Регистрационный номер:
Торговое название: **Полифан®**
Международное непатентованное название: лигнин гидролизный
Лекарственная форма: порошок для приема внутрь
Состав: Лигнин гидролизный
Описание: Темно-коричневая комкующаяся влажная на ощупь рыхлая масса без запаха или темно-коричневый аморфный влажный порошок без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: энтеросорбент
Код АТХ: [A07BC]

Фармакологические свойства:
Полифан® - природный энтеросорбент, состоящий из продукта гидролиза компонентов древесины полимера лигнина, структурными элементами которого являются производные фенилпропана и гидроцеллюлозы.
В просвете желудочно-кишечного тракта Полифан® связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, алкоголь, пищевые аллергены. Препарат сорбирует также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, холестерина, мочевины, метаболитов, ответственных за развитие эндогенного токсикоза.
Полифан® не токсичен, не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 часов.

Показания к применению:
Полифан® применяют в качестве детоксицирующего средства при экзогенных и эндогенных токсикозах различного происхождения.
Для оказания первой помощи при острых отравлениях лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и другими ядами.
При комплексном лечении пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза, дизентерии дисбактериоза, диспепсии, а также гнойно-воспалительных заболеваниях, сопровождающихся интоксикацией.
При печеночной и почечной недостаточности (гипербилирубинемии и гиперазотемии).
Препарат может использоваться для лечения пищевой и лекарственной аллергии. Применяется для выведения из организма ксенобиотиков.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость препарата. Нежелательно использовать препарат при обострении язвенной болезни желудка и 12-ти - перстной кишки, атонии кишечника, анацидном гастрите.

Способ применения и дозы:
Препарат применяют внутрь за час до еды и приема других лекарств, размешав порошок в 50-100 мг воды или запивая водой.
Суточная доза препарата зависит от тяжести заболевания, возраста и массы тела и составляет 0,5-1,0 г/кг массы тела в сутки в 3 приема.
Средние разовые дозы: для детей грудного возраста 0,5-1 чайная ложка на прием; от 1 до 7 лет – 1 десертная ложка; от 7 лет и старше, а также взрослым – 1 столовая ложка на прием 3 – 4 раза в сутки.
Длительность лечения при острых состояниях 3-5 дней, при аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях до 14 дней.
При необходимости возможны повторные курсы лечения спустя две недели по рекомендации врача.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Возможно снижение всасывания некоторых одновременно применяемых внутрь препаратов, в связи с чем рекомендуется соблюдать интервал 1 - 1,5 часа между приемом Полифан® и др. лекарственных средств.
Побочное действие:
В редких случаях отмечаются запоры, аллергические реакции.
Длительное использование энтеросорбента (более 20 дней) может приводить к нарушению всасывания витаминов, кальция, в связи с чем рекомендуется профилактический прием поливитаминов и препаратов кальция.
Форма выпуска:
Полифан® порошок для приема внутрь.

- По 100 г в пакет из материала комбинированного «Буфлен», с одной стороны которого на самом пакете нанесен текст этикетки, а с другой стороны нанесен текст этикетки, а с другой стороны нанесен текст инструкции по применению.
- По 100 г в непрозрачный пакет из окрашенной полиэтиленовой пленки для пищевых продуктов, с одной стороны которого на самом пакете нанесен текст этикетки, а с другой стороны нанесен текст инструкции по применению.
- По 500 г или 1000 г в прозрачный пакет из пленки полиэтиленовой, на который с одной стороны наклеивают самоклеящуюся этикетку, а с другой стороны наклеивают этикетку с текстом инструкции по применению.

Условия хранения:
В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности:
3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек:
Отпускается без рецепта.

Производитель/организация принимающая претензии
ОАО «СТИ-МЕД-СОРБ», 610044, г. Киров, ул. Луганская, д. 53 а,
тел.(495) 956-76-83, (8332) 53-60-11.

Директор ИДКЭЛС Буданов С.В.

Представитель фирмы
ОАО «СТИ-МЕД-СОРБ» Смирнова М.Н.