МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПОЛИФЕПАН®

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: Полифепан®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Лигнин гидролизный

Лекарственная форма: порошок для приёма внутрь.

Состав:

Действующее вещество: лигнин гидролизный (полифепан®) от 30,0 до 50,0 % (в пересчете на сухое вещество).

Описание: Аморфный порошок темно-коричневого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа:

Энтеросорбирующее средство.

Код АТХ – A07BC

Фармакологические свойства:

Лигнин гидролизный – природный энтеросорбент, состоящий из продукта гидролиза компонентов древесины - полимера лигнина, структурными элементами которого являются производные фенилпропана и гидроцеллюлозы

Обладает высокой сорбционной активностью и неспецифическим детоксикационным действием.

Связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, алкоголь, аллергены, а также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, холестерина, мочевины, метаболитов, ответственных за развитие эндогенного токсикоза.

Не токсичен, не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 часов.

Показания к применению:

В качестве детоксикационного средства у взрослых и детей при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения:

- острые отравления лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и другими ядами;

- комплексное лечение пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза, дизентерии, дисбактериозов, диспепсии;
- гнойно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией;
- гипербилирубинемия и гиперазотемия (печеночная и почечная недостаточность);
- нарушения липидного обмена (атеросклероз, ожирение);
- пищевая и лекарственная аллергия;
- выведение из организма ксенобиотиков.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость препарата, обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, атония кишечника, анацидный гастрит.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы:

Внутрь за час до еды и приёма других лекарственных средств, размешав в 50-100 мл воды или запивая водой. Доза препарата зависит от тяжести заболевания, возраста и массы тела и составляет 0,5-1,0 г/кг массы тела за сутки в 3-4 приёма.

Средние дозы: для детей грудного возраста – 0,5-1 чайная ложка, от 1 до 7 лет – 1 десертная ложка, от 7 лет и старше, а также взрослым – 1 столовая ложка на приём 3-4 раза в сутки.

Длительность лечения при острых состояниях 3-5 дней, при аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях до 14 дней.

При необходимости возможны повторные курсы лечения спустя две недели по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие:

Редко - аллергические реакции, запор.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь лекарственных средств.

Между приемом препарата и других лекарственных средств необходим временной интервал в 1-2 ч.

Если Вы применяете лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Полифепан® проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Между приемом препарата и других лекарственных средств необходим временной интервал в 1-2 ч.

Препарат может использоваться в комплексной терапии с другими лекарственными средствами, при соблюдении правил раздельного приема.

Длительное применение (более 20 дней) может приводить к нарушению всасывания витаминов, кальция, в связи с чем, рекомендуется профилактический приём поливитаминов и препаратов кальция.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Не изучалось.

Форма выпуска:

Порошок для приема внутрь.

По 10 г, 50 г, 100 г, 200 г или 250 г в пакет из комбинированного материала «буфлен».

По 10 пакетов массой 10 г или по одному пакету массой 50 г, или 100 г, или 200 г, или 250 г вместе с инструкцией по применению в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения:

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Не принимать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ООО «Восток», Россия, 612711, Кировская область, Омутнинский район, территория Восточное городское поселение, территория дорога Восточный-Филипповка, д. 19, стр. 1.Тел/факс: (83352) 33-1-59.
E-mail: vostokbiohim@mail.ru

Генеральный директор
ООО «Восток» Д.Н. Пантелеев