

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалиста)

по медицинскому применению препарата

КАТЕДЖЕЛЬ С ЛИДОКАИНОМ**Регистрационный номер****Торговое название:** катеджель с лидокаином**МНН или группировочное название:** Лидокаин + Хлоргексидин &**Лекарственная форма:** гель для местного применения**Состав:** 100 г содержат:*активные вещества:* лидокаина гидрохлорида.....2,00 г

хлоргексидина дигидрохлорида.....0,05 г

вспомогательные вещества:

гизтеллозы (гидроксиэтилцеллюлозы).....1,50 г

глицерола.....20,00 г

воды для инъекций.....до 100,00 г

Описание: прозрачный, бесцветный или почти бесцветный гель**Фармакотерапевтическая группа:**

антисептическое средство + местноанестезирующее средство

Код АТХ: G04A**Фармакологическое действие**

Комбинированный препарат, оказывающий антисептическое и местноанестезирующее действие. Хлоргексидин - противомикробный препарат, действующий на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, дрожжи, дерматофиты. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий - *Treponema spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas spp.*, *Chlamydia spp.*, *Ureaplasma spp.* Сохраняет активность (хотя несколько сниженную) в присутствии крови, гноя, различных секретов и органических веществ.


Лидокаин - местный анестетик.

Противомикробное действие и адекватная анестезия развиваются через 5-10 мин после применения препарата.

Водорастворимый прозрачный гель обеспечивает четкий оптический обзор и обладает смазывающим эффектом при различных эндоскопических процедурах.

Показания

Профилактика инфекции, анестезия при оперативных и диагностических эндоскопических вмешательствах у детей и взрослых в урологии, гинекологии, проктологии, все формы эндоскопии, замена фистульных катетеров, интубация.



Применяется в комплексной терапии при купировании симптомов воспаления (сопровождающихся болевым синдромом) слизистой оболочки мочеиспускательного канала, влагалища, цервикального канала и прямой кишки.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

С осторожностью - Беременность (I триместр).

В случае применения в период лактации следует воздерживаться от кормления ребенка грудью в течение 12 ч после использования препарата.

Способ применения

Для медленной инстилляций перед введением инструментов (врачом или специально обученным персоналом) необходимо:

- раскрыть блистер, удаляя бумагу с прозрачного корпуса (по возможности только до перетяжки);
- отломать кончик без значительного усилия (по возможности еще в упаковке). При этом необходимо проследить, чтобы кончик был полностью удален, во избежание повреждения слизистой. Для облегчения введения рекомендуется предварительно выдавить каплю геля;
- инстилляция посредством легкого давления на гофрированный шприц. После опорожнения шприца необходимо держать его в сжатом состоянии до изъятия.
- введение инструментов рекомендуется проводить через 5-10 минут после инстилляции геля.

Побочные действия

При повышенной чувствительности возможны аллергические реакции (аллергический дерматит; кожная сыпь, ангионевротический отек), жжение в месте аппликации.

Передозировка

Симптомы (при системном действии лидокаина в случаях тяжелых повреждений мочеиспускательного канала): брадикардия, судороги, коллапс.

Лечение: при брадикардии - бета-адреностимуляторы, при судорогах - барбитураты или миорелаксанты короткого действия, при коллапсе - эпинефрин или допамин вводится внутривенно.

Взаимодействие

Избегать совместного применения с препаратами йода.

Ингибиторы МАО усиливают местноанестезирующее действие лидокаина.

Несовместим с мылом, а также детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза). Совместим с лекарственными средствами, содержащими катионную группу (бензаткония хлорид).



Особые указания

Препарат стерилен и предназначен для однократового введения.

В случае применения в период лактации следует воздерживаться от кормления ребенка грудью в течение 12 ч после использования препарата.

Формы выпуска:

По 12,5 г в однократовый полипропиленовый гофрированный шприц с вытянутым и отламывающимся наконечником. Шприц помещают в блистер, состоящий из двух частей: верхняя — пропиленовая плёнка, выдерживающая стерилизацию паром, нижняя — бумажная.

1. Блистер вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку.

2. Упаковка для стационара:

1 шприц помещают в блистер. По 5 или 25 блистеров помещают в картонную коробку, на боковой стороне которой печатается текст инструкции по применению.

Условия хранения:

Список Б. В защищённом от света месте при температуре от + 15 до + 25 °С.

Хранить в местах недоступных для детей.

Срок годности:

5 лет. Использовать препарат можно только с учетом срока годности, указанного на упаковке.

Отпуск из аптек:

По рецепту.

Производитель:

"Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х." 6060 Абзам/ Тироль, Австрия.

Организация, принимающая претензии потребителя:

Представительство компании "Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х." в Москве: 107150 г.Москва, ул.Бойцовая, дом 24, стр.3 тел./факс: (495) 781 71 08

Глава представительства компании

Е.К. Миронова

И.о. директора ИДКЭЛС

А.Н. Васильев

