

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского
применения

Катеджель с лидокаином
Гель для местного применения

Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х., Австрия


Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » **070716** 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Особые указания Препарат стерилен и предназначен для однократного введения. В случае применения в период лактации следует воздерживаться от кормления ребенка грудью в течение 12 ч после использования препарата.	Особые указания Препарат стерилен и предназначен для однократного введения. В случае применения в период лактации следует воздерживаться от кормления ребенка грудью в течение 12 ч после использования препарата. Региональная и местная анестезия должна проводиться опытными специалистами в соответствующем образом оборудованном помещении при доступности готового к немедленному использованию оборудования и препаратов, необходимых для проведения мониторинга сердечной деятельности и реанимационных мероприятий. Персонал, выполняющий анестезию, должен быть квалифицированным и обучен технике выполнения анестезии, должен быть знаком с диагностикой и лечением системных токсических реакций,

Старая редакция	Новая редакция
	нежелательных явлений и реакций и других осложнений.

Директор представительства компании
Фармацойтише Фабрик
Монтавит Гез.м.б.Х



Е. Плотникова

