

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Катеджель с лидокаином

Гель для местного применения

Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « » 300518 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 100 г содержат: <i>Действующие вещества</i> Лидокаина гидрохлорида 2,00 г Хлоргексидина гидрохлорида 0,05 г <i>Вспомогательные вещества</i> Гизтиллозы (Гидроксиэтилцеллюлозы) 2,00 г Глицерола 20,00 г Натрия лактата раствор 1,047 г Воды для инъекций до 100 г	Состав 100 г содержат: <i>Действующие вещества</i> Лидокаина гидрохлорида 2,00 г Хлоргексидина дигидрохлорида 0,05 г <i>Вспомогательные вещества</i> Гизтиллозы (Гидроксиэтилцеллюлозы) 2,00 г Глицерола 20,00 г Натрия лактата раствор 1,047 г Воды для инъекций до 100 г
Производитель Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х., Зальцбергштрассе 96,	Производитель Фармацойтише Фабрик Монтавит Гезельшафт м.б.Х., Зальцбергштрассе

6067, Абзам, Австрия.	96, 6067, Абзам, Австрия.
Организация, принимающая претензии потребителей Представительство компании «Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.» в Москве: 107150 г. Москва, ул. Бойцовая, дом 22, стр.3 тел./факс: (495) 781 71 08	Организация, принимающая претензии потребителей Представительство компании «Фармацойтише Фабрик Монтавит Гезельшафт м.б.Х. (Австрия)» : 107150 г. Москва, ул. Бойцовая, дом 22, тел./факс: (495) 974 82 83
Формы выпуска По 12,5 г в одноразовый полипропиленовый гофрированный шприц с вытянутым и отламывающимся наконечником. Шприц помещают в блистер, состоящий из двух частей : верхняя – полипропиленовая пленка, выдерживающая стерилизацию паром, нижняя – бумажная. 1. Блистер вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку. 2. Упаковка для стационара: по 5 или 25 блистеров помещают в картонную коробку, на боковой стороне которой печатается текст инструкции по применению.	Формы выпуска По 12,5 г в одноразовый полипропиленовый гофрированный шприц с вытянутым и отламывающимся наконечником. Шприц помещают в блистер, состоящий из двух частей: верхняя – полипропиленовая пленка, выдерживающая стерилизацию паром, нижняя – бумажная. 1. Блистер вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку. 2. Упаковка для стационара: -по 5 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку. -по 25 блистеров помещают в картонную коробку, на боковой стороне которой печатается текст инструкции по применению.

Изменение № _____ к Инструкции _____ С. 3

Директор представительства компании

«Фармацойтише Фабрик

Монтавит Гезельшафт м.б.Х.»



Е. Плотникова