МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-001975- 290916
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Лидокаин Асепт
наименование лекарственного препарата

спрей для местного применения
лекарственная форма, дозировка

Открытое акционерное общество
Научно-производственный центр «Биоген» Россия,
наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « 290916 » 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав. 1 мл препарата содержит: Активные вещества лидокаина гидрохлорида моногидрат 0,1 г, хлоргексидина биглюконат- 0,0005 г; Вспомогательные вещества: спирт этиловый- 0,484 мл, пропиленгликоль- 0,1 мл, левоментол- 0,005, натрия гидроксид до pH 5,0-7,0 вода очищенная - до 1 мл.	**Состав** 1 мл препарата содержит: *активные вещества:* лидокаина гидрохлорида моногидрат (в пересчете на лидокаина гидрохлорид) - 0,1 г, хлоргексидина биглюконата раствор 20 % в пересчете на хлоргексидина биглюконат - 0,0005 г; *вспомогательные вещества:* этанол (спирт этиловый) 96 % - 0,484 мл, пропиленгликоль - 0,1 мл, левоментол - 0,005 г, натрия гидроксид до pH 5,0-7,0, вода очищенная - до 1 мл.

Старая редакция	Новая редакция
Описание Прозрачная с желтоватым оттенком жидкость с характерным запахом спирта этилового и ментола.	**Описание** Прозрачная бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость с характерным запахом спирта этилового и ментола.
Особые указания; В случае применения в период лактации следует воздержаться от кормления ребенка грудью в течение 12 часов после использования препарата. Избегать попадания препарата в глаза.	**Особые указания** В случае применения в период лактации следует воздержаться от кормления ребенка грудью в течение 12 часов после использования препарата. Избегать попадания препарата в глаза. Регионарная и местная анестезия должна проводиться опытными специалистами в соответствующем образом оборудованном помещении при доступности готового к немедленному использованию оборудования и препаратов, необходимых для проведения мониторинга сердечной деятельности и реанимационных мероприятий. Персонал, выполняющий анестезию, должен быть квалифицированным и обучен технике выполнения анестезии, должен быть знаком с диагностикой и лечением системных токсических реакций, нежелательных явлений и реакций, и других осложнений.

Старая редакция	Новая редакция
Условия хранения; В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.	**Условия хранения** В защищенном от света месте при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.
Указание на необходимость хранения лекарственного препарата в местах, недоступных для детей; Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.	Раздел исключен
Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата. ОАО НПЦ «Биоген» Россия, 440060, Пензенская обл., г. Пенза, 5-й Виноградный проезд, 24 Б.	**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата** ОАО НПЦ «Биоген», Россия, 440066, Пензенская обл., г. Пенза, 5-й Виноградный проезд, 24 Б.

Представитель
ОАО НПЦ «БИОГЕН»

подпись

Л.В. Антипова
ФИО