МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ 181119 1CR009540/09 СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Лизиноприл-Акрихин

таблетки 5 мг, 10 мг, 20 мг

Адифарм ЕАД, Болгария

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 181119 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания • Повышенная чувствительность к лизиноприлу, другим компонентам препарата или другим ингибиторам АПФ; • Ангионевротический отек в анамнезе, в том числе и от применения ингибиторов АПФ, наследственный отек Квинке и/или идиопатический ангионевротический отек; • Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); • Беременность и период грудного вскармливания; • Одновременное применение с алискиреном и препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом и/или умеренными или тяжелыми нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73м^2 площади поверхности тела); • Одновременное применение с	**Противопоказания** • Повышенная чувствительность к лизиноприлу, другим компонентам препарата или другим ингибиторам АПФ; • Ангионевротический отек в анамнезе, в том числе и от применения ингибиторов АПФ, наследственный отек Квинке и/или идиопатический ангионевротический отек; • Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); • Беременность и период грудного вскармливания; • Одновременное применение с алискиреном и препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом и/или умеренными или тяжелыми нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73м^2 площади поверхности тела); • Одновременное применение с

Старая редакция	Новая редакция
антагонистами рецепторов ангиотензина II (АРА II) у пациентов с диабетической нефропатией; • Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.	антагонистами рецепторов ангиотензина II (АРА II) у пациентов с диабетической нефропатией; • Одновременное применение с ингибиторами нейтральной эндопептидазы (например, с препаратами, содержащими сакубитрил) в связи с высоким риском развития ангионевротического отека; • Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Производитель Адифарм ЕАД, бульвар Симеоновское шоссе 130, 1700 София, Болгария Тел: (++ 359 2) 860 20 18; факс: (++359 2) 860 20 18	**Производитель** Адифарм ЕАД, бульвар Симеоновско шоссе 130, 1700 София, Болгария

Представитель фирмы Ворожцова Е.Д.