



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЛИМОННИКА СЕМЯН НАСТОЙКА

Номер регистрационного удостоверения:

Торговое наименование

Лимонника семян настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование

Лимонника китайского семена

Лекарственная форма

Настойка

Состав:

Для приготовления 1000 мл настойки необходимо:

Действующее вещество:

Лимонника семена – 200 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (этиловый спирт) 95 % - достаточное количество до получения 1000 мл настойки.

Описание

Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневатого-желтого цвета с характерным запахом. При хранении допускается появление маслянистых капель.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующее средство растительного происхождения

Код АТХ: A13A

Фармакологическое действие

Оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышает артериальное давление, умственную и физическую работоспособность.

Показания к применению

Астенический синдром, переутомление, в комплексной терапии при ослаблении половой функции на фоне неврастении, психическое и физическое перенапряжение, реконвалесценция после соматических и инфекционных заболеваний, нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу, для повышения работоспособности организма при повышенных физических и умственных нагрузках.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), нарушение сердечной деятельности, повышенная возбудимость, эпилепсия, нарушения сна, острые инфекционные и вирусные заболевания, заболевания печени, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст старше 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 20-30 капель, разведенных в небольшом количестве воды, 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды или через 4 часа после приема пищи. Курс лечения 30-40 дней, при необходимости возможно проведение повторных курсов по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат

только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции, тахикардия, нарушение сна, головная боль, повышение артериального давления.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин и др.). Является физиологическим антагонистом средств, угнетающих центральную нервную систему (в т.ч. барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных, седативных препаратов, нейролептиков и др.).

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Лимонника семян настойка проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

При выпадении маслянистых капель содержимое флакона перед употреблением необходимо взбалтывать.

Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание нарушения сна.

Препарат содержит не менее 85 % этанола. В максимальной суточной дозе препарата содержится 2,78 г абсолютного этилового спирта, в максимальной разовой дозе препарата содержится 0,93 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

При приеме препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстро-

ты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми.

По 25 мл препарата во флаконы-капельницы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми.

По 25 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73

Директор

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»



Л.Я. Рабинович