


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ



ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Виктоза®

раствор для подкожного введения

6 мг/мл

Ново Нордиск А/С, Дания

Регистрационный номер: ЛСП-004405/10 от 18.05.2010

Изменение № 1

270421

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Передозировка По данным клинических исследований и пострегистрационного применения лираглутида были зарегистрированы случаи передозировки с увеличением дозы до превышающей рекомендованную дозу в 40 раз (72 мг). Был отмечен один случай передозировки с превышением дозы в 10 раз (18 мг ежедневно) в течение 7 месяцев. Как правило, пациенты отмечали тяжёлую тошноту, рвоту и диарею, но выздоравливали без остаточных явлений. Ни у кого из пациентов не было отмечено тяжёлой гипогликемии. В случае передозировки препарата Виктоза® рекомендуется проведение соответствующей симптоматической терапии.	Передозировка По данным клинических исследований и пострегистрационного применения лираглутида были зарегистрированы случаи передозировки с увеличением дозы до превышающей рекомендованную дозу в 40 раз (72 мг). Сообщалось о случаях тяжёлой тошноты, рвоты, диареи и тяжелой гипогликемии. В случае передозировки рекомендуется проведение соответствующей симптоматической терапии. Пациента следует наблюдать на предмет клинических признаков обезвоживания и контролировать концентрацию глюкозы крови.

Старший специалист по регистрации
медицинской продукции

ООО «Ново Нордиск»



А.Г. Гуржиева

134656