МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Вазотенз Н

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50+12,5 мг, 100+25 мг

лекарственная форма, дозировка

АО «АКТАВИС», Исландия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 270712 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ Артериальная гипертензия (у пациентов, для которых комбинированная терапия является оптимальной).	**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ** - Артериальная гипертензия (у пациентов, для которых комбинированная терапия является оптимальной); - Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ Внутрь, вне зависимости от приема пищи. Обычная начальная и поддерживающая доза препарата составляет 50мг лозартана + 12,5мг гидрохлоротиазида (1 таблетка) в день.	**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ** Внутрь, независимо от приема пищи, запивая стаканом воды. *Артериальная гипертензия* Вазотенз Н можно применять с другими антигипертензивными средствами. Вазотенз Н назначают пациентам, у

Изменение № 1 к инструкции

Старая редакция	Новая редакция
Для тех пациентов, у которых при этой дозировке не удается добиться адекватного контроля АД, доза может быть увеличена до 2-х таблеток (50 мг/12,5 мг) или 1 таблетки (100 мг/25 мг) 1 раз в день. Максимальная доза составляет 2 таблетки (50 мг/12,5 мг) или 1 таблетка (100 мг/25 мг) 1 раз в день. В целом, максимальный гипотензивный эффект достигается в течение 3-х недель после начала лечения. Нет необходимости в специальном подборе начальной дозы пациентам пожилого возраста.	которых не удалось достичь целевых уровней АД на фоне приема лозартана или гидрохлоротиазида в монотерапии. Рекомендуется изначально оттитровать дозу индивидуальных компонентов (лозартана и гидрохлоротиазида). Затем можно перейти на прием фиксированной комбинации препарата Вазотенз Н. Обычно начальная и поддерживающая дозы препарата - 1 таблетка (50 мг лозартана + 12,5 мг гидрохлоротиазида) в день. Для тех пациентов, у которых при этой дозировке не удается достичь целевых уровней АД, доза может быть увеличена до 2-х таблеток (50 мг/12,5 мг) или 1 таблетки (100 мг/25 мг) 1 раз в день. Максимальная доза - 2 таблетки (50 мг/12,5 мг) или 1 таблетка (100 мг/25 мг) 1 раз в день. В целом, максимальный гипотензивный эффект достигается в течение 3-4-х недель после начала лечения. *Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка* Стандартная начальная доза лозартана (препарата Вазотенз) составляет 50 мг 1 раз в сутки. Пациентам, у которых не удалось достичь целевых уровней АД на фоне приема препарата Вазотенз 50 мг/сутки, требуется подбор терапии путем

Изменение № 1 к инструкции

Старая редакция	Новая редакция
	комбинации лозартана с низкими дозами гидрохлоротиазида (12,5 мг) – Вазотенз Н, и, в случае необходимости, следует увеличить дозу до 2-х таблеток препарата Вазотенз Н (100 мг лозартана и 25 мг гидрохлоротиазида в сутки однократно). Нет необходимости в специальном подборе начальной дозы для пациентов пожилого возраста.

Медицинский директор
ООО «Актавис»

подпись

Вильчинская М.Ю.