МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-010504/09 - 110322
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ломилан® Соло

наименование лекарственного препарата

таблетки для рассасывания, 10 мг

лекарственная форма, дозировка



Лек д.д., Словения

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 110322 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания • Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата; • фенилкетонурия (таблетки для рассасывания Ломилан® Соло содержат аспартам,	**Противопоказания** • Непереносимость или гиперчувствительность к лоратадину или любому другому компоненту препарата; • фенилкетонурия (таблетки для рассасывания Ломилан® Соло

являющийся источником фенилаланина); • дети с массой тела менее 30 кг; • период грудного вскармливания; • наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.	содержат аспартам, являющийся источником фенилаланина); • дети возрастом до 3 лет и с массой тела менее 30 кг; • период грудного вскармливания; • непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Способ применения и дозы Внутрь. Таблетки для рассасывания Ломилан® Соло можно принимать независимо от времени приема пищи. Взрослые и дети старше 12 лет: 1 таблетка для рассасывания (10 мг) 1 раз в день. Дети в возрасте до 12 лет *с массой тела более 30 кг*: 1 таблетка для рассасывания (10 мг) 1 раз в день. Максимальная продолжительность самостоятельного лечения составляет 10 дней.  1. Отделите один элемент блистера по линиям перфорации.	**Способ применения и дозы** Внутрь. Таблетки для рассасывания Ломилан® Соло можно принимать независимо от времени приема пищи. Взрослые, в том числе пожилые, и подростки старше 12 лет: рекомендуется прием в дозе 1 таблетка для рассасывания (10 мг) 1 раз в день. Дети в возрасте от 3 до 12 лет *с массой тела более 30 кг*: 1 таблетка для рассасывания (10 мг) 1 раз в день.  1. Отделите один элемент блистера по линиям перфорации.

 2. Оторвите фольгу в направлении, указанном стрелкой, и осторожно выньте таблетку из упаковки.  3. Чтобы принять таблетку нет необходимости запивать ее водой или другой жидкостью, положите таблетку на язык и подождите, пока она полностью растворится. Пациентам *пожилого возраста и с почечной недостаточностью* не требуется коррекция доз. Пациентам с *тяжелым нарушением функции печени* начальная доза должна составлять 10 мг (1 таблетка для рассасывания) через день.	 2. Оторвите фольгу в направлении, указанном стрелкой, и осторожно выньте таблетку из упаковки.  3. Чтобы принять таблетку нет необходимости запивать ее водой или другой жидкостью, положите таблетку на язык и подождите, пока она полностью растворится. Пациентам *пожилого возраста и с почечной недостаточностью* не требуется коррекция доз. Взрослым и детям при массе тела более 30 кг с *тяжелым нарушением функции печени* начальная доза должна составлять 10 мг (1 таблетка для рассасывания) через день. Максимальная продолжительность самостоятельного лечения составляет 10 дней. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы

	усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.
Претензии потребителей направлять в ЗАО «Сандоз»: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3; телефон: (495) 660-75-09; факс: (495) 660-75-10.	***Организация, принимающая претензии от потребителей:*** АО «Сандоз», 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 70; телефон: (495) 660 75 09; факс: (495) 660 75 10.

Директор департамента по
разработке продуктов
АО «Сандоз» Горожанин А.В.