

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Антарейт

наименование лекарственного препарата

таблетки жевательные, 400 мг+20 мг, 800 мг+40 мг

лекарственная форма, дозировка

Селебрити Биофарма Лтд., Индия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « » 141117 20 г.


Старая редакция	Новая редакция
Раздел отсутствует	Регистрационный номер
Состав <u>1 таблетка жевательная дозировкой 400/20 мг содержит:</u> Активные вещества: магалдрат – 400 мг, симетикон (в пересчете на диметилполисилоксан) – 30,77 (20) мг. Вспомогательные вещества: этилцеллюлоза – 18,0 мг, макрогол-4000 – 70,0 мг, сорбитол – 256,59 мг, сукралоза – 2,16 мг, аспартам – 2,50 мг, ароматизатор карамельный – 6,48 мг, кремния диоксид коллоидный – 4,5 мг, глицерил дибегенат – 9,0 мг. <u>1 таблетка жевательная дозировкой 800/20 мг содержит:</u> Активные вещества: магалдрат – 800 мг,	Состав: <u>1 таблетка жевательная дозировкой 400 мг+20 мг содержит:</u> Действующие вещества: магалдрат – 400,00 мг, симетикон (в пересчете на диметилполисилоксан) – 30,77 (20,00) мг. Вспомогательные вещества: этилцеллюлоза – 18,00 мг, макрогол-4000 – 70,00 мг, сорбитол – 256,59 мг, сукралоза – 2,16 мг, аспартам – 2,50 мг, ароматизатор карамельный – 6,48 мг, кремния диоксид коллоидный – 4,50 мг, глицерил дибегенат – 9,00 мг. Масса таблетки – 800,00 мг. <u>1 таблетка жевательная дозировкой 800 мг+20 мг содержит:</u> Действующие вещества: магалдрат –

симетикон (в пересчете на диметилполисилоксан) – 61,54 (40) мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> этилцеллюлоза – 36,00 мг, макрогол-4000 – 140,0 мг, сорбитол - 513,18 мг, сукралоза – 4,32 мг, аспартам – 5,0 мг, ароматизатор карамельный – 12,96 мг, кремния диоксид коллоидный – 9,0 мг, глицерил дибегенат – 18,0 мг.	800,00 мг, симетикон (в пересчете на диметилполисилоксан) – 61,54 (40,00) мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> этилцеллюлоза – 36,00 мг, макрогол-4000 – 140,00 мг, сорбитол - 513,18 мг, сукралоза – 4,32 мг, аспартам – 5,00 мг, ароматизатор карамельный – 12,96 мг, кремния диоксид коллоидный – 9,00 мг, глицерил дибегенат – 18,00 мг. Масса таблетки – 1600,00 мг
Способ применения и дозы Внутрь. Таблетки следует тщательно разжевать или держать во рту до полного рассасывания. Взрослые и подростки старше 12 лет: если врачом не рекомендовано иначе, 1-2 таблетки принимают через короткое время после еды. При необходимости можно повторить прием препарата через 2 часа. Максимальная суточная доза для таблеток 400/20 мг - 16 таблеток; для таблеток 800/40 мг - 8 таблеток.	Способ применения и дозы Внутрь. Таблетки следует тщательно разжевать или держать во рту до полного рассасывания. Взрослые и подростки старше 12 лет: если врачом не рекомендовано иначе, 1-2 таблетки принимают через короткое время после еды. При необходимости можно повторить прием препарата через 2 часа. Максимальная суточная доза для таблеток 400 мг+20 мг - 16 таблеток; для таблеток 800 мг+40 мг - 8 таблеток.
Форма выпуска Таблетки жевательные 400/20 мг и 800/40 мг. По 6 таблеток в блистер из ПВХ/А1 фольги. По 2 или 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку	Форма выпуска Таблетки жевательные 400 мг+20 мг и 800 мг+40 мг. По 6 таблеток в блистер из ПВХ/А1 фольги. По 2 или 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.
Условия отпуска Отпускают без рецепта	Условия отпуска Отпускается без рецепта
Производитель “Сиквел Фармасьютикалс Pvt.Лтд.”, N/46, Эдишнл MIDC, Ананд Нагар,	Производитель Селебрити Биофарма Лтд., Индия Вилледж Панга, Виа Джармаджри, Хилл-

Амбарнатх 421504, Махараштра, Индия.

Топ Индастриал Эстейт, Баротивала,
Дистрикт Солан (Эйч. Пи.), Индия.Генеральный директор
ООО «РЕМЕДИЯ»

С.В. Матковский



105224