

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МАРЕНЫ КРАСИЛЬНОЙ ЭКСТРАКТ

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Марены красильной экстракт**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Марены
корневищ и корней экстракт**Лекарственная форма:** таблетки**Состав на одну таблетку***Активного компонента*

Марены красильной экстракта сухого – 0,25 г
с содержанием суммы антрагликозидов
в пересчете на руберитриновую кислоту
и абсолютно сухое вещество 8,0 %

Вспомогательных веществ

[сахар молочный (лактоза), крахмал картофельный,
тальк, кальция стеарат] – достаточное количество
до получения таблетки
массой 0,50 г

Описание

Таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от светло-коричневого до коричневого цвета с более темными и более светлыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии; другие средства, применяемые в урологии.

Код АТХ: G04BX

Фармакологическое действие

Основным действующим веществом препарата является марены красильной экстракт сухой, получаемый из лекарственного растительного сырья: корневищ и корней марены красильной – *Rubia tinctorum* L. и марены грузинской – *Rubia iberica* (Fisch. ex DC.) K. Koch., сем. мареновых – *Rubiaceae*.

Фармакодинамика

Марены красильной экстракт сухой обладает диуретическим и спазмолитическим действием, снижает тонус и активизирует перистальтику гладкой мускулатуры мочевых путей, способствует сдвигу pH мочи в кислую сторону и разрыхлению мочевых

конкрементов, содержащих фосфаты кальция и магния. Препарат уменьшает боли, способствует отхождению мелких конкрементов из мочевых путей.

Фармакокинетика

Препарат представляет собой сухой экстракт корневищ и корней марены красильной и содержит сложный комплекс биологически активных соединений, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

Препарат применяют у взрослых пациентов с мочекаменной болезнью (нефроуролитиазом), для уменьшения болей спастического характера и облегчения отхождения мелких камней и песка, содержащих фосфаты кальция и магния. Профилактика рецидивов после оперативного вмешательства, а также при фосфатурии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый и хронический гломерулонефрит, выраженная почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка в период обострения, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания (в связи с отсутствием специальных исследований).

Способ применения и дозы

Внутрь, по 0,25 г (1 таблетка) 3 раза в день. При необходимости доза может быть увеличена до 0,50-0,75 г (2-3 таблетки) 3 раза в день. Таблетки перед приемом растворяют в 100 мл (1/2 стакана) теплой воды.

Курс лечения – 20-30 дней. Проведение повторного курса лечения возможно через 4-6 недель после консультации с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы

Передозировка препарата может вызвать боли, связанные с отхождением конкрементов.

При возникновении болей необходимо обратиться к врачу.

Лечение

Симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования взаимодействия не проводились.

Особые указания

При применении препаратов марены красильной моча окрашивается в красноватый цвет.

При появлении интенсивного окрашивания в буро-красный цвет необходимо уменьшить дозу или временно прервать курс лечения.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности или требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (работа диспетчера/оператора, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки, 250 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 30 таблеток в банки оранжевого стекла, укупоренные крышками полиэтиленовыми резьбовыми с уплотняющим элементом. Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. Крышки заливают парафином нефтяным твердым для пищевой промышленности.

Каждую банку или 1, 2, 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.