

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА УРОЦИСТЕНАЛ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Уроцистенал

Международное непатентованное или группировочное наименование: Марены
корневищ и корней экстракт

Лекарственная форма: капли для приема внутрь

Состав

10 мл содержат:

действующее вещество: марены красильной экстракт сухой (содержание суммы
антрагликозидов в пересчете на руберитриновую кислоту не менее 8,0 %) - 0,0093 г

вспомогательные вещества: магния салицилат - 0,140 г, аниса обыкновенного
плодов масло - 1,475 г, фенхеля обыкновенного горького травы масло - 1,475 г, эвкалипта
листьев масло - 2,800 г, этанол (спирт этиловый абсолютный) - 0,750 г, линолевая
кислота - 0,700 г, линоленовая кислота - 0,700 г, клещевины обыкновенной семян масло
жирное (касторовое масло) - до 10 мл.

Описание

Прозрачная жидкость темно-красного цвета с ароматическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: средства, применяемые в урологии; другие
средства, применяемые в урологии.

Код АТХ: G04BX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат оказывает спазмолитическое, умеренное диуретическое и
противовоспалительное действие.

Препарат уменьшает боли, расслабляет гладкие мышцы мочеточников и облегчает
отхождение мелких конкрементов; способствует сдвигу pH мочи в кислую сторону и
разрыхлению мочевых конкрементов, содержащих фосфаты кальция и магния.

Фармакокинетика

Препарат в качестве действующих компонентов содержит комплекс биологически
активных веществ растительного происхождения, в связи с чем проведение
фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

В комплексной терапии мочекаменной болезни, кристаллурии, спазмов мочевыводящих путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый и хронический гломерулонефрит, почечная недостаточность, пиелонефрит, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта в период обострения, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Ввиду наличия в составе препарата магния салицилата: повышенная чувствительность к салицилатам (в т.ч. бронхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП); полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВП, включая ингибиторы циклооксигеназы-2 (в т.ч. в анамнезе)).

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга (т.к. в состав препарата входит этиловый спирт).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием данных по безопасности применения препарата у данных категорий пациентов. При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания, необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания на время приема препарата.

Способ применения и дозы

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Препарат принимают внутрь, за 30 мин до еды, по 3-5 капель 3 раза в сутки (в небольшом количестве воды или на кусочке сахара). При необходимости возможно временное повышение дозы до 10 капель 3 раза в сутки.

При повышенной кислотности желудочного сока, при изжоге, препарат следует принимать во время или после еды.

Курс лечения 3-4 недели. Проведение повторного курса возможно через 4-6 недель по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте

препарата только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, изжога, нарушение функции кишечника, окрашивание мочи в красноватый цвет.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось. При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования взаимодействия не проводились. Следует избегать одновременного приема препарата с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Препарат не следует применять при почечной колике.

При отсутствии противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой и мочевыводящей систем, пациентам в период применения препарата рекомендуется употреблять не менее 1,5-2 литров жидкости в сутки.

Препарат окрашивает мочу в красноватый цвет.

Применение препарата на кусочке сахара следует избегать пациентам с сопутствующим сахарным диабетом, а также с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахарозно-изомальтазной недостаточностью.

Максимальная разовая (10 капель) и максимальная суточная доза препарата (30 капель) содержат около 0,02 г и 0,06 г спирта этилового абсолютного соответственно.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения препаратом следует воздерживаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

По 10 мл препарата во флакон темного стекла вместимостью 15 мл, снабженный вставкой-капельницей из сополимера полипропилен/полиэтилен или полиэтилена черного цвета, с навинчиваемой пластмассовой крышкой с контролем первого вскрытия.

Флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять после окончания срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Фармамед», Россия

194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, ул. Домостроительная, д. 16, литера Е, помещ. 2

Производитель

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел.: +7 (8332) 22 01 26

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Фармамед», Россия

194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, ул. Домостроительная, д. 16, литера Е, помещ. 2

Тел.: +7 (812) 647 02 46

Email: info@farmamedspb.ru