

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АПИЛАК**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Апилак**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Маточное
молочко**Лекарственная форма:** таблетки подъязычные**Состав на одну таблетку***Активного компонента*

Апилака лиофилизированного — 0,01 г
(Маточное молочко) с содержанием суммы ненасыщенных
жирных кислот в пересчете на 10-окси-2-деценовую кислоту
и сухое вещество 5 %

Вспомогательных веществ

Сахара молочного (лактозы моногидрат) — 0,1275 г
Крахмала картофельного — 0,0080 г
Талька — 0,0030 г
Кальция стеарата — 0,0015 г

Описание

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого до белого
с желтоватым оттенком цвета с мелкими вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующие средства.

Код АТХ

A13A.

Фармакологические свойства

Апилак — пчелиное маточное молочко — представляет собой секрет, вырабатываемый
аллотрофическими железами рабочих пчел. В составе апилака обнаружены витамины,

макро- и микроэлементы, аминокислоты, в том числе и незаменимые, и ряд других биологически активных веществ.

Препарат обладает общетонизирующим действием, стимулирует клеточный метаболизм.

Показания к применению

В период реконвалесценции после перенесенных заболеваний, при нарушении лактации (гипогалактия) в послеродовом периоде. В качестве вспомогательного средства при лечении невротических расстройств и артериальной гипотензии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, к продуктам пчеловодства; болезнь Аддисона, возраст до 18 лет (из-за отсутствия достаточного количества клинических данных); дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (из-за наличия лактозы).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно после консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Сублингвально, взрослым по 1 таблетке (10 мг) 3 раза в сутки. Таблетку следует положить под язык и держать до полного рассасывания. Длительность курса лечения составляет 10-15 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции, бессонница.

При появлении аллергических реакций необходимо прекратить прием препарата.

При бессоннице следует уменьшить дозу или отменить препарат.

При появлении побочных действий проконсультироваться с врачом.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих особой концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Таблетки подъязычные, 10 мг. По 10, 25 или 50 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток, или 1 контурную ячейковую упаковку по 25 таблеток, или 1 контурную ячейковую упаковку по 50 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.